

Beskonačne i konačne formulacije matematičkih rezultata

Vjekoslav Kovač*

Sažetak

Ovaj rad diskutira raznovrsne trikove kojima se beskonačna formulacija nekog problema može svesti na konačnu i obratno. Predstavljeni primjeri su poznati problemi iz aritmetičke kombinatorike i euklidske geometrije, dok predstavljene tehnike dolaze iz matematičke analize i matematičke logike.

Ključne riječi: *aritmetička progresija, gustoća skupa, pakiranje sfera, gustoća pakiranja, bojenje ravnine, kromatski broj.*

Infinitary and finitary formulations of mathematical results

Abstract

This paper discusses various tricks used to reduce an infinitary formulation of a problem to a finitary one, and vice versa. The presented examples are famous problems from arithmetic combinatorics and the Euclidean geometry, while the presented techniques come from mathematical analysis and mathematical logic.

Keywords: *arithmetic progression, set density, sphere packing, packing density, plane coloring, chromatic number.*

*Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, email: vjekovac@math.hr

1 Uvod

Čest je slučaj u matematici da isti rezultat ili otvoreni problem ima dvije formulacije: *beskonačnu*, koja se tiče neke beskonačne matematičke strukture, i *konačnu*, koja je izražena pomoću njezinih konačnih ili ograničenih podstruktura. Ovdje ćemo izložiti ideje kojima se ponekad može pokazati da su takve dvije formulacije međusobne ekvivalentne. U tu će nam svrhu poslužiti tri zanimljiva i povijesno važna primjera. U svakom od njih pokazat ćemo da „beskonačna tvrdnja“ i odgovarajuća „konačna tvrdnja“ impliciraju jedna drugu, bez da uopće pokušamo dokazati neku od njih. Naime, u primjerima koji slijede te tvrdnje su ili vrlo teški teoremi (kojima se mogu posvetiti čitavi kursevi i knjige) ili do danas otvoreni istraživački problemi.

Ovaj članak je nastao na temelju jednog autorovog predavanja u sklopu fakultativnog predmeta *Studentska natjecanja iz matematike*, koji se izvodi na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2 Szemerédijev teorem

Naredni rezultat je jedno od najspektakularnijih dostignuća kombinatorike cijelih brojeva. Kao pitanje su ga postavili Erdős i Turán [6], a odgovor je prvi dao Szemerédi [14], tek četrdesetak godina kasnije.

Gustoća skupa $A \subseteq \mathbb{N}$ je broj


$$\varrho(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, 2, \dots, n\}|}{n}, \quad (1)$$

pri čemu $|S|$ naprosto označava broj elemenata konačnog skupa $S \subseteq \mathbb{N}$. Tako je, naprimjer, gustoća skupa parnih brojeva jednaka $1/2$, a može se pokazati da su gustoće skupa potpunih kvadrata i skupa prostih brojeva jednake 0 . Općenito gustoća nekog skupa ne mora postojati, jer pripadni niz ne mora konvergirati. Ako se u gornjoj formuli limes zamijeni limesom superiorom, tada govorimo o *gornjoj gustoći* skupa A , koju pišemo $\bar{\varrho}(A)$. Njezina je prednost što je uvijek dobro definirana. Štoviše, uvodi se još suptilniji pojam *gornje Banachove gustoće* skupa $A \subseteq \mathbb{N}$ kao broj $\bar{\varrho}_{\text{Ban}}(A) \in [0, 1]$ dan sa

$$\bar{\varrho}_{\text{Ban}}(A) := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \in \mathbb{N}} \frac{|A \cap \{m, m+1, \dots, m+n-1\}|}{n}. \quad (2)$$



Endre Szemerédi (1940.), mađarsko-američki matematičar koji se najviše bavi kombinatorikom. Dobitnik je Pólyine nagrade 1975. godine, Steeleove nagrade 2008. godine i Abelove nagrade 2012. godine.



Stefan Banach (1892.–1945.), poljski matematičar koji je utemeljio funkcionalnu analizu. Smatra ga se jednim od najvažnijih matematičara 20. stoljeća.

Čim skup A ima gustoću, odmah je jasno da vrijedi

$$q(A) = \bar{q}(A) \leq \bar{q}_{\text{Ban}}(A).$$

Skupovi pozitivne gustoće „zauzimaju“ izvjesni udio prirodnih brojeva pa očekujemo da ćemo u njima vidjeti razne „uzorke“. Najjednostavniji uzorak je *aritmetička progresija* ili *konačni aritmetički niz* u skupu \mathbb{N} , a definira se kao k -torka brojeva

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + (k - 1)d$$

za neke $a, d, k \in \mathbb{N}$. Broj k je *duljina* gornje progresije. Za fiksirani $k \in \mathbb{N}$ označimo s $r_k(n)$ broj elemenata najvećeg skupa $B \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ koji ne sadrži aritmetičku progresiju duljine k . Prisjetimo se da pišemo $f(n) = o(g(n))$ kada $n \rightarrow \infty$ ako vrijedi $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$.

Teorem 2.1. *Neka je $k \geq 3$ prirodan broj. Sljedeće dvije tvrdnje su ekvivalentne.*

Beskonačna formulacija (SzB): *Ako skup $A \subseteq \mathbb{N}$ zadovoljava $\bar{q}_{\text{Ban}}(A) > 0$, tada on sadrži aritmetičku progresiju duljine k .*

Konačna formulacija (SzK): *Vrijedi $r_k(n) = o(n)$ kada $n \rightarrow \infty$.*

Kao što smo već bili najavili, tvrdnje (SzB) i (SzK) su dvije formulacije *Szemerédijevog teorema*. Nađeni su mu brojni dokazi, ali baš svi su vrlo teški i iziskuju neelementarne ideje. Mi ćemo se zadovoljiti time da pokažemo ekvivalenciju tvrdnji (SzB) i (SzK).

Očigledno uvjet $\bar{q}(A) > 0$ implicira $\bar{q}_{\text{Ban}}(A) > 0$, a lako je uvjeriti se da obrat ne mora vrijediti. Radi toga je formulacija Szemerédijevog teorema navedena pod (SzB) jača od analogne formulacije pomoću gornje gustoće, koja se često javlja u literaturi. Tvrdnje (SzB) i (SzK) postaju netrivialne već za $k = 3$ i taj posebni slučaj naziva se *Rothov teorem* [12]; o njemu je bilo riječi u jednom od prethodnih brojeva ovog časopisa [2]. Napomenimo kako i skupovi gornje Banachove gustoće 0 mogu sadržavati po volji duge aritmetičke progresije, premda Szemerédijev teorem o njima ne govori. Naprimjer, Green i Tao [7] su dokazali da isto vrijedi za skup prostih brojeva.

Dokaz teorema 2.1. Najprije dokazujemo (SzK) \implies (SzB). Neka su $A \subseteq \mathbb{N}$ skup i δ broj takvi da vrijedi $0 < \delta < \bar{q}_{\text{Ban}}(A)$. Radi pretpostavke $\lim_{n \rightarrow \infty} r_k(n)/n = 0$ znamo da postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ takav da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $r_k(n) \leq \delta n$. Nadalje, po definiciji gornje Banachove gustoće (2) i definiciji limesa superiora, postoje $n \geq n_0$ i $m \in \mathbb{N}$ takvi da je

$$|A \cap \{m, m + 1, \dots, m + n - 1\}| > \delta n.$$



Klaus Friedrich Roth (1925.–2015.), britanski matematičar koji se bavio kombinatorikom i teorijom brojeva. Dobitnik je Fieldsove medalje 1958. godine i Sylvesterove medalje 1991. godine.

Promotrimo skup

$$B := (A \cap \{m, m + 1, \dots, m + n - 1\}) - m + 1,$$

tj. skup $A \cap \{m, m + 1, \dots, m + n - 1\}$ translatican za $m - 1$ ulijevo. On je podskup od $\{1, 2, \dots, n\}$ i ima više od $\delta n \geq r_k(n)$ elemenata pa mora sadržavati aritmetičku progresiju duljine k , ali to znači da A sadrži kopiju te progresije dobivenu pomakom za $m - 1$.

Sada prelazimo na dokaz obratne implikacije, (SzB) \implies (SzK). Pretpostavimo da ne vrijedi tvrdnja (SzK), što znači da postoje $\varepsilon > 0$ i strogo rastući niz $(n_j)_{j=1}^\infty$ u \mathbb{N} takvi da je $r_k(n_j) \geq \varepsilon n_j$ za svaki $j \in \mathbb{N}$. Nadalje, po definiciji broja $r_k(n_j)$ može se naći skup $B_j \subseteq \{1, 2, \dots, n_j\}$ takav da je $|B_j| \geq \varepsilon n_j$ i da B_j ne sadrži aritmetičku progresiju duljine k . Rekurzivno zadajmo niz brojeva $(m_j)_{j=1}^\infty$ kao

$$m_1 = 0, \quad m_j = 2m_{j-1} + 2n_{j-1} \quad \text{za } j \geq 2.$$

Konačno definirajmo

$$A := \bigcup_{j=1}^\infty (B_j + m_j).$$

Brojeve m_j smo odabrali da rastu dovoljno brzo kako ne bi postojala progresija duljine 3 u skupu A koja bi sjekla barem dva različita skupa $B_j + m_j$. Po konstrukciji skupova B_j zaključujemo da A uopće ne sadrži aritmetičku progresiju duljine k . S druge strane, za svaki $j \in \mathbb{N}$ imamo

$$|A \cap \{m_j + 1, m_j + 2, \dots, m_j + n_j\}| = |B_j + m_j| = |B_j| \geq \varepsilon n_j$$


pa je $\bar{q}_{\text{Ban}}(A) \geq \varepsilon > 0$, što vodi na kontradikciju s pretpostavkom (SzB). \square

3 Pakiranja kugala

Euklidski prostor \mathbb{R}^d želimo što ekonomičnije popuniti kuglama polumjera 1. Primjer jednog vrlo ekonomičnog popunjavanja u dvije dimenzije skiciran je na slici 1. Prije svega, pojasnimo što mislimo pod „popunjavanjem“ i kako se mjeri njegova gustoća. U ovom će nam odjeljku $|S|$ označavati d -dimenzionalni volumen skupa $S \subseteq \mathbb{R}^d$.

Pakiranje kugala u skup $S \subseteq \mathbb{R}^d$ je svaki skup $P \subseteq S$ koji je unija kugala jediničnog polumjera s međusobno disjunktним nutrinama; kolekciju svih takvih pakiranja P označit ćemo $\text{Pak}(S)$. Vežano uz izbor $S = [0, r]^d$, $r > 0$, definiramo

$$p([0, r]^d) := \max_{P \in \text{Pak}([0, r]^d)} \frac{|P|}{r^d}, \quad (3)$$



Slika 1: Primjer pakiranja krugova u \mathbb{R}^2 .

tj. $p([0, r]^d)$ je najveća gustoća pakiranja kugala u kocku $[0, r]^d$. Navedeni maksimum doista postoji, tj. postiže se, naprosto zato što postoji neki najveći broj kugala koje se mogu „smjestiti“ u $[0, r]^d$. S druge strane, vezano uz izbor $S = \mathbb{R}^d$, za pakiranje kugala u cijeli prostor ima smisla gledati njegovu *gustoću*, definiranu sa

$$\varrho(P) := \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{|P \cap [-s, s]^d|}{(2s)^d}. \quad (4)$$

(Primijetite analogiju s veličinom $\varrho(A)$ iz (1).) Označimo s $\text{Pak}^*(\mathbb{R}^d)$ kolekciju svih pakiranja kugala u \mathbb{R}^d koja imaju dobro definiranu gustoću, tj. za koja postoji gornji limes.

Teorem 3.1. *Za svaki $d \in \mathbb{N}$ vrijedi*

$$\lim_{r \rightarrow \infty} p([0, r]^d) = \sup_{r \in (0, \infty)} p([0, r]^d) = \max_{P \in \text{Pak}^*(\mathbb{R}^d)} \varrho(P).$$

Pritom se ujedno tvrdi da navedeni limes i maksimum doista postoje.

Direktna posljedica teorema 3.1 je sljedeća veza gustoće optimalnog pakiranja kugala u cijeli prostor \mathbb{R}^d i asimptotike gustoća optimalnih pakiranja kugala u kocke $[0, r]^d$ kada $r \rightarrow \infty$.

Korolar 3.1. *Za $d \in \mathbb{N}$ i $\alpha \in [0, 1]$ sljedeće dvije tvrdnje su ekvivalentne.*

Beskonačna formulacija (PakB): *Svako pakiranje iz $\text{Pak}^*(\mathbb{R}^d)$ ima gustoću najviše α i postoji pakiranje u $\text{Pak}^*(\mathbb{R}^d)$ gustoće točno jednake α .*

Konačna formulacija (PakK): $\lim_{r \rightarrow \infty} p([0, r]^d) = \alpha$.

Broj α za koji vrijedi tvrdnja (PakB) možemo zvati *konstanta pakiranja kugala* za prostor \mathbb{R}^d i označavati $p(\mathbb{R}^d)$. Teorem 3.1 garantira da taj broj uvijek postoji, a korolar 3.1 kaže da bismo ga, makar samo teoretski, mogli računati kao

$$p(\mathbb{R}^d) = \lim_{r \rightarrow \infty} p([0, r]^d).$$

Prirodno je zapitati se koliko zapravo iznosi $p(\mathbb{R}^d)$ za danu dimenziju d . To je vrlo težak problem i odgovor je poznat samo u sljedećim dimenzijama:

- $d = 1$, kada je $p(\mathbb{R}) = 1$;
- $d = 2$, kada je $p(\mathbb{R}^2) = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \approx 0.9069$, a optimalno pakiranje prikazano je na slici 1;
- $d = 3$, kada je $p(\mathbb{R}^3) = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.7405$, što je bilo poznato kao *Keplerova slutnja*, a dokazao ju je Hales [9];
- $d = 8$, kada je $p(\mathbb{R}^8) = \frac{\pi^4}{2^4 4!} \approx 0.2537$, što je dokazala Viazovska [17];
- $d = 24$, kada je $p(\mathbb{R}^{24}) = \frac{\pi^{12}}{12!} \approx 0.0019$, što su dokazali Cohn, Kumar, Miller, Radchenko i Viazovska [4].



Johannes Kepler (1571.–1630.), njemački astronom i matematičar. Dao je prve vjerodostojne zakone gibanja planeta.

Primjeri pakiranja koja daju gornje konstante očigledni su u dimenzijama $d = 1, 2, 3$. Npr. u \mathbb{R}^3 možemo zamisliti da u kutiju slažemo naranče.

U dokazu teorema 3.1 koristit će nam sljedeći rezultat Silvermana [13] i Toeplitza [16], čiji pak dokaz zahtijeva samo osnovno znanje matematičke analize, a može se naći npr. u knjigama [1] i [5].

Teorem 3.2 (Silverman-Toeplitzov teorem). *Neka je $(a_{m,n})_{m,n=1}^{\infty}$ beskonačna matrica realnih brojeva koja ima sljedeća svojstva:*

- $\lim_{m \rightarrow \infty} a_{m,n} = 0$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,
- $\sup_{m \in \mathbb{N}} \sum_{n=1}^{\infty} |a_{m,n}| < \infty$,
- $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n} = 1$.

Ako je $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergentni niz realnih brojeva, tada konvergira i niz $(y_m)_{m=1}^{\infty}$ zadan sa

$$y_m := \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n} x_n \quad \text{za svaki } m \in \mathbb{N}$$

te vrijedi $\lim_{m \rightarrow \infty} y_m = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Dokaz teorema 3.1. Označimo:

$$\beta := \sup_{r \in (0, \infty)} p([0, r]^d)$$

i najprije dokažimo da vrijedi

$$\lim_{r \rightarrow \infty} p([0, r]^d) = \beta. \quad (5)$$

Za svaki ε takav da je $0 < \varepsilon < \beta$ postoje $r_\varepsilon > 0$ i pakiranje kugala P_ε u kocku $[0, r_\varepsilon]^d$ volumena većeg od $(\beta - \varepsilon/2)r_\varepsilon^d$. Za bilo koji $k \in \mathbb{N}$ kocku $[0, kr_\varepsilon]^d$ možemo podijeliti na k^d kongruentnih manjih kocaka. Svaku od njih možemo pakirati translatom od P_ε te unija svih tih pakiranja daje pakiranje od $[0, kr_\varepsilon]^d$ volumena većeg od $(\beta - \varepsilon/2)k^d r_\varepsilon^d$. Za bilo koji $r \geq r_\varepsilon$ i jedinstveni $k \in \mathbb{N}$ takav da je $kr_\varepsilon \leq r < (k+1)r_\varepsilon$ sada imamo

$$p([0, r]^d) > \frac{(\beta - \varepsilon/2)k^d r_\varepsilon^d}{(k+1)^d r_\varepsilon^d} = \left(\beta - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)^d.$$

Ako je $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ dovoljno velik da vrijedi

$$\left(1 - \frac{1}{k_\varepsilon + 1}\right)^d \geq \frac{\beta - \varepsilon}{\beta - \varepsilon/2},$$

tada za svaki $r \geq k_\varepsilon r_\varepsilon$ imamo

$$\beta - \varepsilon < p([0, r]^d) \leq \beta.$$

Time je dokazano (5).

Sada pokažimo da je

$$q(P) \leq \beta \quad \text{za svako pakiranje } P \in \text{Pak}^*(\mathbb{R}^d). \quad (6)$$

Pretpostavimo suprotno, tj. da postoji pakiranje kugala P u \mathbb{R}^d takvo da je $q(P) > \beta$ te označimo $\delta := (q(P) - \beta)/2 > 0$. Po definiciji gustoće pakiranja (4) postoji $s_0 > 0$ takav da za svaki $s \geq s_0$ vrijedi

$$\frac{|P \cap [-s, s]^d|}{(2s)^d} > q(P) - \delta = \beta + \delta. \quad (7)$$

Odaberimo $s \geq \max\{s_0, 2\}$ dovoljno velik da vrijedi i

$$\left(1 - \frac{2}{s}\right)^d > 1 - \delta. \quad (8)$$

Sada promotrimo sve kugle pakiranja P koje se cijele nalaze u $[-s, s]^d$ i označimo njihovu uniju s P' . Sve točke iz $P \cap [-s, s]^d$ koje nisu u P' udaljene su za manje od 2 od ruba kocke $[-s, s]^d$, tj.

$$(P \cap [-s, s]^d) \setminus P' \subseteq [-s, s]^d \setminus [-(s-2), s-2]^d,$$

što nam daje

$$|P \cap [-s, s]^d| - |P'| \leq (2s)^d - (2s-4)^d.$$

Translacijom možemo P' pretvoriti u pakiranje kugala u kocku $[0, 2s]^d$ pa smo dobili

$$p([0, 2s]^d) \geq \frac{|P'|}{(2s)^d} \geq \frac{|P \cap [-s, s]^d|}{(2s)^d} - \left(1 - \left(1 - \frac{2}{s}\right)^d\right),$$

a radi (7) i (8) konačno imamo $p([0, 2s]^d) > \beta$. To vodi na kontradikciju s definicijom broja β i dokazuje (6).

Još jedino trebamo naći pakiranje $P \in \text{Pak}^*(\mathbb{R}^d)$ gustoće točno β . Tvrdnja je trivijalna u dimenziji $d = 1$ pa u daljnjem pretpostavimo $d \geq 2$. Za svaki $n \geq 2$ uzmimo pakiranje kugala P_n u kocku $[0, n]^d$ koje postiže maksimum iz definicije (3) broja $p([0, n]^d)$. Prostorne „pojaseve“

$$\mathbb{R}^{d-1} \times \left[\frac{(n-1)n}{2}, \frac{n(n+1)}{2} \right] \quad \text{i} \quad \mathbb{R}^{d-1} \times \left[-\frac{n(n+1)}{2}, -\frac{(n-1)n}{2} \right]$$

možemo „zazidati“ translacijama kocke $[0, n]^d$, a uniju odgovarajućih translata od P_n označimo \tilde{P}_n . Konačno definirajmo $P := \bigcup_{n=2}^{\infty} \tilde{P}_n$. Tvrdimo da je $q(P) = \beta$. Za bilo koji $s \geq 1$ neka je $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, jedinstveni broj takav da je

$$\frac{(m-1)m}{2} \leq s < \frac{m(m+1)}{2}. \quad (9)$$

Svakako imamo

$$2 \sum_{n=2}^{m-1} \left(\frac{2s}{n} - 1\right)^{d-1} |P_n| \leq |P \cap [-s, s]^d| \leq 2 \sum_{n=2}^m \left(\frac{2s}{n} + 1\right)^{d-1} |P_n|.$$

Kako je $p([0, n]^d) = |P_n|/n^d$ to se može zapisati

$$\sum_{n=2}^{m-1} \frac{n}{s} \left(1 - \frac{n}{2s}\right)^{d-1} p([0, n]^d) \leq \frac{|P \cap [-s, s]^d|}{(2s)^d} \leq \sum_{n=2}^m \frac{n}{s} \left(1 + \frac{n}{2s}\right)^{d-1} p([0, n]^d),$$

a potom primjenom (9) slijedi da se $|P \cap [-s, s]^d|/(2s)^d$ nalazi između

$$\left(1 - \frac{1}{m}\right)^{d-1} \sum_{n=2}^{m-1} \frac{2n}{m(m+1)} p([0, n]^d)$$

i

$$\left(1 + \frac{1}{m-1}\right)^{d-1} \sum_{n=2}^m \frac{2n}{(m-1)m} p([0, n]^d).$$

Upotrebom teorema 3.2 i dokazane činjenice (5) lako vidimo da oba ta izraza konvergiraju prema β kada $s \rightarrow \infty$, što radi (9) ujedno znači da $m \rightarrow \infty$. Po teoremu o sendviču zaključujemo

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{|P \cap [-s, s]^d|}{(2s)^d} = \beta,$$

što smo i trebali pokazati. □

4 Kromatski broj ravnine

Sljedeći poznati otvoreni problem pripisuje se matematičarima Hadwigeru i Nelsonu.

Koji najmanji broj boja je potreban za bojenje svih točaka ravnine tako da svake dvije točke udaljene točno za 1 imaju različite boje?

Nije teško primjerom pokazati da je 7 boja dovoljno; pogledajte sliku 2. Tek nedavno je de Grey [8] pokazao da je zapravo nužno koristiti barem 5 boja. Ako ravninu \mathbb{R}^2 shvatimo kao jednostavni neusmjereni (ali beskonačni) graf čiji vrhovi su upravo njezine točke, a dva vrha su spojena bridom ako i samo ako su pripadne točke udaljene za 1, tada traženi broj možemo nazvati *kromatski broj ravnine* i označavati $\chi(\mathbb{R}^2)$. Svaki konačni skup točaka $S \subseteq \mathbb{R}^2$ inducira njegov podgraf: opet su dvije točke spojene bridom ako i samo ako su na međusobnoj udaljenosti 1. Najmanji broj boja potreban za njegovo bojenje pišemo $\chi(S)$.

Sljedeći teorem dokazali su de Bruijn i Erdős [3] i to u nešto većoj općenitosti nego što je nama potrebna.

Teorem 4.1 (de Bruijn-Erdősov teorem). *Za $k \in \mathbb{N}$ sljedeće dvije tvrdnje su ekvivalentne.*

Beskonačna formulacija (KrB): $\chi(\mathbb{R}^2) \leq k$, tj. ravnina se može „pravilno“ obojiti u k boja.

Konačna formulacija (KrK): *Za svaki konačni skup $S \subseteq \mathbb{R}^2$ vrijedi $\chi(S) \leq k$, tj. svaki konačni podskup ravnine S se može „pravilno“ obojiti u k boja.*




Hugo Hadwiger (1908.–1981.), švicarski matematičar. Bavio se geometrijom, kombinatorikom i kriptografijom.



Edward Nelson (1932.–2014.), američki matematičar. Bavio se matematičkom fizikom i matematičkom logikom



Aubrey David Nicholas Jasper de Grey (1963.), britanski biolog i pisac.



Slika 2: Pravilno bojenje ravnine u 7 boja. Pravilni šesterokuti na slici imaju stranice duljine 0.499. Nije važno kako su obojeni njihovi rubovi, dokle god je to učinjeno na konzistentan način.

Posljedica teorema 4.1 je

$$\chi(\mathbb{R}^2) = \max\{\chi(S) : S \subseteq \mathbb{R}^2 \text{ konačan}\}.$$

Zapravo je de Grey u članku [8] pokazao $\chi(\mathbb{R}^2) \geq 5$ upravo tako što je u ravnini konstruirao skup S od 1585 točaka za koji vrijedi $\chi(S) = 5$. Ekivalencija $(\text{KrB}) \iff (\text{KrK})$ mu je dala metodološku podlogu za istraživanje: ako je doista $\chi(\mathbb{R}^2) \geq 5$ tada se to u teoriji moralo moći dokazati nalaženjem (dovoljno velikog) konačnog podgrafa S za kojeg je $\chi(S) \geq 5$.

Začudo, dokaz teorema 4.1 počiva na matematičkoj logici i teoriji skupova. Zato ćemo se prije njegovog dokaza morati prisjetiti logike sudova. Alfabet logike sudova sastoji se od skupa propozicionalnih varijabli \mathcal{P} , skupa logičkih veznika $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ i zagrada. Rekurzivno se definiraju formule logike sudova (vidjeti skriptu [18]), to su simbolički izrazi poput

$$(A \wedge B) \rightarrow (B \vee (\neg C \leftrightarrow A))$$

za $A, B, C \in \mathcal{P}$. Semantičko značenje im pridaje tek interpretacija, a to je svaka funkcija $I: \mathcal{P} \rightarrow \{\text{„laž“}, \text{„istina“}\}$. Vrijednost interpretacije I na pojedinoj formuli F je opet „laž“ ili „istina“, a definira se rekurzivno, prema uobičajenim pravilima za logičke veznike (opet vidjeti [18]). Za skup formula \mathcal{F} kažemo da je *ispunjiv* ako postoji interpretacija I takva da za svaku formulu $F \in \mathcal{F}$ vrijedi $I(F) = \text{„istina“}$. *Teorem kompaktnosti logike sudova* glasi:

Ako je ispunjiv svaki konačni podskup od \mathcal{F} , tada je ispunjiv i cijeli \mathcal{F} .

Njegov dokaz se može naći u skripti [18], pri čemu treba imati na umu da nama skup propozicionalnih varijabli ne mora biti prebrojiv. U dokazu se nužno koristi aksiom izbora.

Dokaz teorema 4.1. Dokazujemo samo implikaciju $(\text{KrK}) \implies (\text{KrB})$, jer je obrat trivijalan. Neka je dan k -člani skup boja, kojeg, radi jednostavnosti, poistovjećujemo s $\{1, 2, \dots, k\}$. Za skup propozicionalnih varijabli uzimamo $\mathcal{P} := \mathbb{R}^2 \times \{1, 2, \dots, k\}$, tj. skup svih parova (točka, boja). Zapišimo sada jezikom logike sudova činjenicu da je bojenje pravilno:

- $(T, 1) \vee (T, 2) \vee \dots \vee (T, k)$ za svaku točku $T \in \mathbb{R}^2$, što čitamo: „točka T je obojena nekom od boja $1, 2, \dots, k$ “;
- $\neg((T, i) \wedge (T, j))$ za svaku točku $T \in \mathbb{R}^2$ i svake međusobno različite $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$, što čitamo: „nije tako da točka T istovremeno ima boje i i j “;
- $\neg((T_1, i) \wedge (T_2, i))$ za svake točke $T_1, T_2 \in \mathbb{R}^2$ međusobno udaljene za 1 i svaki $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, što čitamo: „nije tako da točke T_1 i T_2 na međusobnoj udaljenosti 1 imaju istu boju i “.

Ako nađemo interpretaciju I koja sve gornje formule evaluira u „istina“, tada ćemo točku T obojiti bojom i ako i samo ako je $I((T, i)) = \text{„istina“}$. Svaki konačni podskup gornjeg skupa formula tiče se samo nekog konačnog skupa točaka ravnine S pa je on ispunjiv po pretpostavci (KrK) . Korištenjem teorema kompaktnosti logike sudova slijedi da je ispunjiv i skup svih gornjih formula, a to je upravo ono što smo trebali. \square

U članku [11] izložene su neke varijante problema bojenja ravnine te su dane daljnje poveznice na literaturu.

5 Zadaci za vježbu

Čitatelju ostavljamo nekoliko zadataka na kojima može isprobati naučene tehnike, ali i samostalno otkriti nove trikove.

Zadatak 1. Neka je \mathcal{S} proizvoljna familija ograničenih zatvorenih podskupova od \mathbb{R}^d , $d \in \mathbb{N}$. Dokažite da je ekvivalentno:

$$(\text{SkupB}) \cap_{S \in \mathcal{S}} S \neq \emptyset,$$

$$(\text{SkupK}) \text{ za svaki } n \in \mathbb{N} \text{ i sve } S_1, S_2, \dots, S_n \in \mathcal{S} \text{ vrijedi} \\ S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n \neq \emptyset.$$

Zadatak 2. Neka je \mathcal{K} proizvoljna familija konveksnih ograničenih zatvorenih podskupova od \mathbb{R}^d , $d \in \mathbb{N}$. Dokažite da je ekvivalentno:

$$(\text{KonvB}) \bigcap_{K \in \mathcal{K}} K \neq \emptyset,$$

$$(\text{KonvK}) \text{ za sve } K_1, K_2, \dots, K_{d+1} \in \mathcal{K} \text{ vrijedi} \\ K_1 \cap K_2 \cap \dots \cap K_{d+1} \neq \emptyset.$$

Napomena. Ovaj rezultat zove se *Hellyjev teorem* [10].

Zadatak 3. Neka su $k \geq 3$ i $m \geq 2$ prirodni brojevi. Dokažite da su sljedeće tvrdnje ekvivalentne.

(vdWB) Ako je svaki prirodni broj obojen u jednu od m boja, tada barem jedna boja sadrži aritmetičku progresiju duljine k .

(vdWK) Postoji $n \in \mathbb{N}$ (ovisan o k i m) sa sljedećim svojstvom: ako je svaki broj iz skupa $\{1, 2, \dots, n\}$ obojen u jednu od m boja, tada barem jedna boja sadrži aritmetičku progresiju duljine k .

Napomena. Tvrdnje (vdWB) i (vdWK) su dvije formulacije tzv. *van der Waerdenovog teorema* [19]. Lako je vidjeti da taj rezultat slijedi iz Szemerédijevog teorema (i povijesno mu je bio motivacija), ali dokažite ekvivalenciju (vdWB) \iff (vdWK) bez pozivanja na rezultate koje ne znate dokazati.

Zadatak 4. Neka je $\mathbb{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ alfabet sastavljen od m slova. Za konačnu ili beskonačnu riječ nad tim alfabetom kažemo da je *kvadratno slobodna* ako ona nije oblika $vuuv$ za neku nepraznu riječ u , neku (moguće praznu) riječ v i neku (moguće praznu, a moguće i beskonačnu) riječ w . Drugim riječima, kvadratno slobodna riječ nema nepraznu podriječ oblika uu . Dokažite da su sljedeće tvrdnje ekvivalentne.

(RijB) Postoji beskonačna kvadratno slobodna riječ nad alfabetom \mathbb{A} .

(RijK) Postoji po volji duga konačna kvadratno slobodna riječ nad alfabetom \mathbb{A} .

Napomena. Tvrdnje (RijB) i (RijK) vrijede za $m \geq 3$ i to je prvi dokazao Thue [15].

Literatura

- [1] J. Boos, *Classical and modern methods in summability*, Oxford Mathematical Monographs, Oxford University Press, Oxford, 2000.

- [2] F. Bosnić, V. Kovač, *Vjerojatnosna lema o regularnosti i njezine primjene u kombinatorici*, Osječki matematički list, vol. **17** (2017), br. 1, 1–29.
- [3] N. G. de Bruijn, P. Erdős, *A colour problem for infinite graphs and a problem in the theory of relations*, Indagationes Math. **13** (1951), 369–373.
- [4] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, Ann. of Math. (2) **185** (2017), no. 3, 1017–1033.
- [5] R. G. Cooke, *Infinite matrices and sequence spaces*, Dover Publications, Inc., New York, 1965.
- [6] P. Erdős, P. Turán, *On Some Sequences of Integers*, J. London Math. Soc. **11** (1936), no. 4, 261–264.
- [7] B. Green, T. Tao, *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*, Ann. of Math. (2) **167** (2008), no. 2, 481–547.
- [8] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [9] T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, Ann. of Math. (2) **162** (2005), no. 3, 1065–1185.
- [10] E. Helly, *Über Mengen konvexer Körper mit gemeinschaftlichen Punkten*, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung **32** (1923) 175–176.
- [11] V. Kovač, *Kromatski broj ravnine — neriješeni problem o bojenju*, math.e, br. 6., 2005.
- [12] K. F. Roth, *On certain sets of integers*, J. London Math. Soc. **28** (1953), 104–109.
- [13] L. L. Silverman, *On various definitions of the sum of a divergent series*, Ph.D. disertacija, University of Missouri, Columbia, 1910.
- [14] E. Szemerédi, *On sets of integers containing no k elements in arithmetic progression*, Acta Arith. **27** (1975), 199–245.
- [15] A. Thue, *Über unendliche Zeichenreihen*, Norske Vid. Skrifter I Mat.-Nat. Kl., Christiania **7** (1906), 1–22.
- [16] O. Toeplitz, *Über allgemeine lineare Mittelbildungen*, Prace Matematyczno-Fizyczne **22**, (1911), no. 1, 113–119.

- [17] M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Ann. of Math. (2) **185** (2017), no. 3, 991–1015.
- [18] M. Vuković, *Matematička logika 1*, skripta, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2000.
- [19] B. L. van der Waerden, *Beweis einer Baudetschen Vermutung*, Nieuw. Arch. Wisk. **15** (1927), 212–216.