

Jedna zanimljiva primjena Stjuartove teoreme

Šefket Arslanagić

Sarajevo, BiH

Sažetak: U ovom radu, koristeći dobro poznatu Stjuartovu¹ teoremu, dokazujemo zanimljivu trigonometrijsku nejednakost za trougao kod kojeg težište pripada upisanoj kružnici.

Povod za pisanje ovog rada je bio dokaz jedne trigonometrijske nejednakosti za trougao $\triangle ABC$ koja glasi:


$$(\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma)(\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma) > \frac{27}{5}, \quad (1)$$

gdje su α, β, γ unutrašnji uglovi trougla $\triangle ABC$, a težište tog trougla, tačka G , pripada kružnici k upisanoj tom trouglu čiji je centar tačka I .

Najprije ćemo iskazati Stjuartovu teoremu. Posmatrajmo trougao $\triangle ABC$ i duž AP pri čemu je P tačka na stranici BC . Neka je $|AP| = p$, $|BP| = m$, $|CP| = n$, odakle je $|BC| = m + n$. Tada vrijedi

$$a(p^2 + mn) = b^2m + c^2n. \quad (2)$$

Više raznih dokaza ove teoreme se može naći u [1–4]. Pređimo sada na dokaz nejednakosti (1).



Slika 1

Slika 2

Neka su tačke I i G (Slika 1) centar upisane kružnice k i težište trougla $\triangle ABC$ gdje $G \in k$. Primjenjujući Stjuartovu teoremu (2) (Slika 2) na trougao $\triangle IAA'$, dobijamo:

$$|IA|^2 \cdot |GA'| + |IA'|^2 \cdot |AG| = |IG|^2 \cdot |AA'| + |GA| \cdot |GA'| \cdot |AA'|. \quad (3)$$

Ciljna skupina: srednja škola

Ključne riječi: Stjuartova teorema, sinusna i kosinusna teorema, A-G nejednakost, stroga nejednakost

Rad preuzet: 2020.

Kategorizacija: Stručni rad

¹Matthew Stewart (1917.-1785.), škotski matematičar

Pošto težište G dijeli svaku težišnicu u omjeru 2 : 1 (računajući od vrha trougla), to imamo da je $|GA'| = \frac{1}{3}t_a$, $|AG| = \frac{2}{3}t_a$, $|AA'| = t_a$, pa iz (3) slijedi zbog $|IG| = r$

$$|IA|^2 \cdot \frac{1}{3}t_a + |IA'|^2 \cdot \frac{2}{3}t_a = r^2 \cdot t_a + \frac{2}{9}t_a^3,$$

što je ekvivalentno sa

$$\frac{1}{3}|IA|^2 + \frac{2}{3}|IA'|^2 = r^2 + \frac{2}{9}t_a^2, \quad (4)$$

a odavde na osnovu činjenice da je IA' težišnica trougla $\triangle IBC$ te da je $|IA'|^2 = \frac{2|IB|^2 + 2|IC|^2 - |BC|^2}{4}$, dobijamo iz (4)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3}|IA|^2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{2|IB|^2 + 2|IC|^2 - |BC|^2}{4} = r^2 + \frac{2}{9} \cdot \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4} \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{3}(|IA|^2 + |IB|^2 + |IC|^2) = r^2 + \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{3}(|AD|^2 + r^2 + |BE|^2 + r^2 + |CF|^2 + r^2) = r^2 + \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{3}((s-a)^2 + (s-b)^2 + (s-c)^2 + 3r^2) = r^2 + \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{3}(3s^2 - 2s(a+b+c) + a^2 + b^2 + c^2) = \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & -\frac{1}{3}s^2 + \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2) = \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & 3s^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & 3\left(\frac{a+b+c}{2}\right)^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & 3(a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc) = 8(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow & 5(a^2 + b^2 + c^2) = 6(ab + bc + ac). \end{aligned} \quad (5)$$

Na osnovu kosinusne teoreme slijedi

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\ c^2 &= a^2 + a^2 - 2ab \cos \gamma, \end{aligned}$$

a odavdje nakon sabiranja ovih jednakosti:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 - bc \cos \alpha - ac \cos \beta - ab \cos \gamma),$$

to jest

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2(bc \cos \alpha + ac \cos \beta + ab \cos \gamma). \quad (6)$$

Sada dobijamo iz (5) i (6)

$$5\left(\frac{\cos \alpha}{a} + \frac{\cos \beta}{b} + \frac{\cos \gamma}{c}\right) = 3\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right),$$

a odavdje nakon sinusne teoreme

$$5\left(\frac{\cos \alpha}{2R \sin \alpha} + \frac{\cos \beta}{2R \sin \beta} + \frac{\cos \gamma}{2R \sin \gamma}\right) = 3\left(\frac{1}{2R \sin \alpha} + \frac{1}{2R \sin \beta} + \frac{1}{2R \sin \gamma}\right),$$

<https://matemackitalent.mk> objaveno na 10.12.2022

što je ekvivalentno sa

$$5(\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma) = 3 \left(\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\sin \beta} + \frac{1}{\sin \gamma} \right). \quad (7)$$

Na osnovu nejednakosti između aritmetičke i harmonijske sredine imamo:

$$\frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\sin \beta} + \frac{1}{\sin \gamma} \right) > \frac{3}{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma},$$

to jest

$$\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\sin \beta} + \frac{1}{\sin \gamma} > \frac{9}{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma}. \quad (8)$$

Najzad iz (7) i (8) dobijamo

$$5(\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma) > \frac{27}{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma},$$

to jest

$$(\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma)(\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma) > \frac{27}{5}.$$

Ovdje vrijedi stroga nejednakost jer u (8) vrijedi stroga nejednakost pošto bi vrijedila jednakost ako je $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$, tj. ako je trougao $\triangle ABC$ jednakostranični u kome vrijedi da je $I \equiv G$, što nije slučaj jer tačka G pripada upisanoj kružnici k u trougao $\triangle ABC$ čiji je centar tačka I .

Literatura

- [1] Š. Arslanagić: *Matematika za nadarene*, Bosanska riječ, Sarajevo, 2005.
- [2] Š. Arslanagić: *Matematička čitanka 5*, Grafičar promet d.o.o., Sarajevo, 2013.
- [3] A. Marić: *Trokut*, Element, Zagreb, 2007.
- [4] E. Specht: *Geometria-sciential atlantis*, Otto van Guericke Universität, Magdeburg, 2001.