

Jens Carstensen и Алија Муминагиќ, Данска

ЕДЕН ИНТЕРЕСЕН ЧЕТИРИАГОЛНИК

Да го разгледаме четириаголникот $ABCD$ во кој
 $AB = a = 325$, $BC = b = 313$, $CD = c = 65$, $DA = d = 109$, $AC = e = 116$, $BD = f = 372$.

Воочуваме дека должините на страните и дијагоналите се природни броеви.
 Да се потсетиме на следната **теорема**:

Ако во четириаголникот $ABCD$, $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$, тогаш $e \perp f$.

Доказ: Нека за четириаголникот $ABCD$ важи $AB = a$,
 $BC = b$, $CD = c$, $DA = d$, $AC = e$, $BD = f$, $e \cap f = \{0\}$, $CO = p$, $AO = r$, $BO = s$,
 $DO = q$, $\angle DOC = \varphi$.

Со примена на косинусната теорема на триаголниците $\triangle ABO$ и $\triangle CDO$ добиваме:

$$a^2 = s^2 + r^2 - 2sr \cos \varphi \quad (1)$$

и

$$c^2 = p^2 + q^2 - 2pq \cos \varphi \quad (2)$$

Со собирање на равенките (1) и (2) добиваме

$$a^2 + c^2 = s^2 + r^2 + p^2 + q^2 - 2 \cos \varphi (sr + pq) \quad (4)$$

Косинусната теорема применета на триаголниците $\triangle BCO$ и $\triangle DAO$ дава:

$$b^2 = p^2 + s^2 - 2ps \cos (180^\circ - \varphi) \quad (5)$$

и

$$d^2 = r^2 + q^2 - 2rq \cos (180^\circ - \varphi) \quad (6)$$

по собирање на равенките (5) и (6) добиваме

$$b^2 + d^2 = p^2 + s^2 + r^2 + q^2 + 2 \cos \varphi (ps + rq) \quad (7)$$

Од $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$, (4) и (7) следи

$$-2 \cos \varphi (sr + pq) = 2 \cos \varphi (ps + rq) \Leftrightarrow \cos \varphi (ps + rq + sr + pq) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\cos \varphi [p(s+q) + r(s+q)] = 0 \Leftrightarrow (s+q)(p+r) \cos \varphi = 0$$

и оттука заради $s+q \neq 0$ и $p+r \neq 0$ следи $\cos \varphi = 0$, т.е. $\varphi = 90^\circ$. ■

Во конкретниот случај имаме $325^2 + 65^2 = 313^2 + 109^2$. Значи, $e \perp f$. Нека и на цртежот 1 е $e \cap f = \{0\}$.

Триаголниците $\triangle AOB$, $\triangle BOC$, $\triangle COD$ и $\triangle DOA$ се правоаголни триаголници или т.н. Питагорини триаголници што треба да се докаже.

Нека $CO = p$, $AO = r$, $BO = s$ и $DO = q$ (цртеж 1). Ќе ја користеме Хероновата формула за пресметување на површина на триаголникот $\triangle BCD$. Следи:

$$\begin{aligned}P_{\Delta}(BCD) &= \sqrt{375(375-372)(375-313)(375-65)} \\ &= \sqrt{375 \cdot 3 \cdot 62 \cdot 310} = \sqrt{(5 \cdot 15 \cdot 62)^2} = 4650.\end{aligned}$$

или $P_{\Delta}(BCD) = \frac{1}{2} f \cdot p$, од каде

$$p = \frac{2 \cdot P_{\Delta}(BCD)}{f} = \frac{2 \cdot 4650}{372} = 245,$$

а од $p+r=e$, т.е. $25+r=116$, следи $r=91$.

На сличен начин добиваме дека $q=60$ и $s=312$. На тој начин ги добивме триаголниците

$$(91, 312, 325), (25, 312, 313), (25, 60, 65) \text{ и } (60, 91, 109).$$

Сите овие триаголници се Питагорини триаголници. ■

Статијата прв пат е објавена во списанието Сигмана СММ