

Општински натпревар 2025

I година

1A. Марија правела тест по математика, кој содржел задачи по алгебра, геометрија и логика. По проверка на резултатите, се покажало дека Марија точно решила половина од задачите по алгебра, 70% од задачите по геометрија и 80% од задачите по логика. Исто така, точно решила 62% од задачите по алгебра и логика заедно, и 74% од задачите по геометрија и логика заедно. Кој е процентот на задачи кои точно ги решила Марија од целиот тест?

Решение. Нека a, g, l се броевите на задачи кои Марија точно ги решила по алгебра, геометрија и логика, соодветно и нека A, G, L се вкупниот број на задачи од алгебра, геометрија и логика на тестот. Тогаш од условите на задачата имаме

$$\begin{aligned} a &= 0,5A & a+l &= 0,62(A+L) \\ g &= 0,7G & g+l &= 0,74(G+L) \\ l &= 0,8L \end{aligned}$$

Со замена во четвртата равенка добиваме

$$0,5A + 0,8L = 0,62A + 0,62L,$$

односно, $0,12A = 0,18L$, т.е. $A = 1,5L$. Слично, со замена во петтата равенка добиваме:

$$0,7G + 0,8L = 0,74G + 0,74L,$$

односно $0,04G = 0,06L$, т.е. $G = 1,5L$. Значи

$$\frac{a+g+l}{A+G+L} = \frac{0,5 \cdot 1,5L + 0,7 \cdot 1,5L + 0,8L}{1,5L + 1,5L + L} = \frac{2,6L}{4L} = 0,65.$$

Според ова, Марија точно решила 65% од задачите на тестот.

1Б. Во понеделник, три банани чинеле колку еден лимон и еден портокал заедно. Во вторник, сите овошја се намалиле за иста сума на пари и два портокали чинеле колку три банани и еден лимон. Исто така, во вторник, цената на половина лимон била 5 денари. Колку била цената на 1 портокал во понеделник?

Решение. Нека x, y, z се цените на бананите, лимоните и портокалите во понеделник, соодветно. Нека намалувањето во вторник било за точно r денари. Тогаш, од условите на задачата, добиваме систем од линеарни равенки:

$$\begin{cases} 3x = y + z \\ 2(z - r) = 3(x - r) + (y - r) \\ 0,5 \cdot (y - r) = 5 \end{cases} \quad (1)$$

Решенијата на (1) може да се добијат ако втората равенка од (1) се запише како $2z = 3x - 2r + y$ и со замена од првата равенка за $3x = y + z$, се добива

$$2z = y + z - 2r + y, \text{ т.е. } z = 2(y - r) = 20.$$

Значи, цената на еден портокал во понеделник била 20 денари.

2АБ. Докажи дека бројот $A = 4 \cdot 3^{n^3 - n + 2}$, каде што n е природен број, може да се претстави како збир од три точни кубови на природни броеви.

Решение. Бројот A го запишуваме во облик

$$A = 4 \cdot 3^{n^3 - n + 2} = 4 \cdot 3^2 \cdot 3^{n^3 - n} = 36 \cdot 3^{n^3 - n} = (1 + 8 + 27)3^{n^3 - n}.$$

Да забележиме и дека $n^3 - n = n(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)$ е производ на три последователни броеви и затоа, е делив со 3. Па, може да се презапише како $n^3 - n = 3p$, $p \in \mathbb{N}$. Следува дека

$$A = (1 + 8 + 27)3^{3p} = 3^{3p} + 8 \cdot 3^{3p} + 27 \cdot 3^{3p} = (3^p)^3 + (2 \cdot 3^p)^3 + (3 \cdot 3^p)^3,$$

односно, бројот A може да се претстави како збир од три точни кубови.


3АБ. Нека AB е дијаметар на кружница. Точката C лежи на отсечката AB при што важи $2 \cdot \overline{AC} = \overline{CB}$. Точките D и E лежат на кружницата така што $DC \perp AB$ и DE е дијаметар на кружницата. Пресметај го односот на плоштините $P_{\triangle ABD} : P_{\triangle CDE}$.

Решение. *Прв начин.* Нека O е центарот на кружницата и нека F е подножјето на нормалата од E кон AB . Бидејќи

$$\angle DCO = \angle EFO = 90^\circ,$$

$$\angle DOC = \angle EOF,$$

како накрсни и $\overline{DO} = \overline{EO}$, триаголниците $\triangle DCO$ и $\triangle EFO$ се складни, па $\overline{CO} = \overline{FO}$. Тогаш, од $\overline{AO} = \overline{BO}$ следува $\overline{AC} = \overline{BF}$. Од $2\overline{AC} = \overline{BC}$, мора $\overline{CF} = \overline{BF}$, значи $\overline{CF} = \frac{1}{3}\overline{AB}$.




Четириаголникот $DCEF$ има дијагонали кои се преполовуваат, па тој е паралелограм, од каде следува дека $P_{\triangle COE} = P_{\triangle DOF}$. Тогаш, $P_{\triangle CDE} = P_{\triangle DCF}$, па за бараниот однос (имајќи во предвид дека DC е висина во двата триаголници) имаме:

$$\frac{P_{\triangle ABD}}{P_{\triangle CDE}} = \frac{P_{\triangle ABD}}{P_{\triangle DCF}} = \frac{\frac{1}{2} \overline{DC} \cdot \overline{AB}}{\frac{1}{2} \overline{DC} \cdot \overline{CF}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{CF}} = 3.$$

Втор начин. Нека M е центар на дадената кружница и M' е проекција на точката E врз AB . Триаголниците CDM и CEM имаат еднаква плоштина. Имено,

$$\begin{aligned} P_{\triangle CDM} &= \frac{1}{2} \overline{MC} \cdot \overline{DC} = \frac{1}{2} \overline{MC} \cdot \overline{EM'} \\ &= P_{\triangle CEM}. \end{aligned}$$

Следува дека $P_{\triangle CDE} = 2P_{\triangle CDM}$. Бидејќи $\overline{AC} = \frac{1}{3} \overline{AB}$, $\overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB}$ имаме дека $\overline{CM} = \frac{1}{6} \overline{AB}$. Триаголниците



ABD и CDM имаат иста висина спуштена од темето D соодветно кон основите AB и CM , па плоштината на триаголникот ABD е

$$P_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{DC} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \overline{CM} \cdot \overline{DC} = 6P_{\triangle CDM}.$$

Од добиените равенства погоре следува дека

$$P_{\triangle ABD} : P_{\triangle CDE} = 6P_{\triangle CDM} : (2P_{\triangle CDM}) = 3 : 1.$$

4A. Ако a, b, c се реални броеви за кои важи $abc = 1$, пресметај ја вредноста на изразот:

$$A = \frac{20a+2025}{a+ab+1} + \frac{20b+2025}{b+bc+1} + \frac{20c+2025}{c+ac+1}.$$

Решение. Од $abc = 1$, следува дека броевите се ненулти. Броителот и именителот од првиот собирук ги множиме со $c \neq 0$, а во вториот собирук со $ac \neq 0$. Последователно важат равенствата:

$$\begin{aligned} A &= \frac{c(20a+2025)}{c(a+ab+1)} + \frac{ac(20b+2025)}{ac(b+bc+1)} + \frac{20c+2025}{c+ac+1} \\ &= \frac{20ac+2025c}{ac+abc+c} + \frac{20abc+2025ac}{abc+abcc+ac} + \frac{20c+2025}{c+ac+1} \\ &= \frac{20ac+2025c}{ac+1+c} + \frac{20+2025ac}{a+c+ac} + \frac{20c+2025}{c+ac+1} \\ &= \frac{2045ac+2045c+2045}{ac+1+c} = 2045. \end{aligned}$$

каде повеќекратно искористивме дека $abc = 1$.

4Б. Нека a, b, c се реални броеви за кои важи $a + b + c = 1$. Докажи дека

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3(1-a)(1-b)(1-c) = 1.$$

Решение. Имаме:

$$\begin{aligned} 1 &= (a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2 + 2abc) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(a^2b + ab^2 + b^2c + abc + bc^2 + c^2a + ca^2 + abc) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(b(a^2 + ab + bc + ac) + c(bc + ca + a^2 + ab)) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(b + c)(a^2 + ab + bc + ca) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(b + c)(a(a + b) + c(a + b)) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + 3(b + c)(a + c)(a + b). \end{aligned}$$

Користејќи дека $b + c = 1 - a$, $a + c = 1 - b$, $a + b = 1 - c$ и заменувајќи во последното равенство, се добива бараното равенство.

II година

1АБ. Нека a, b, c и d се меѓусебно различни реални броеви. Нека a и b се решенија на равенката $x^2 - 10cx - 11d = 0$, а c и d се решенија на $x^2 - 10ax - 11b = 0$. Одреди го збирот $a + b + c + d$.

Решение. Од Виетовите формули имаме $a + b = 10c$ и $c + d = 10a$. Ако ги собереме последните две равенства добиваме $a + b + c + d = 10(a + c)$. Од тоа што a е решение на равенката $x^2 - 10cx - 11d = 0$ и $d = 10a - c$ следува

$$0 = a^2 - 10ca - 11d = a^2 - 10ca - 11(10a - c) = a^2 - 110a + 11c - 10ac.$$

Аналогно добиваме $c^2 - 110c + 11a - 10ac = 0$. Ако ги одземеме овие две последни равенства добиваме: $(a - c)(a + c - 121) = 0$. Последното равенство го делиме со $a - c \neq 0$ и добиваме $a + c = 121$. Значи

$$a + b + c + d = 10(a + c) = 10 \cdot 121 = 1210.$$

2А. Ако z е комплексен број, а a и b комплексни броеви такви што $|a| = |b| = 1, a \neq b$, докажи дека бројот $\frac{1}{a-b}(z + ab\bar{z} - a - b)$ е имагинарен.

Решение. Да означиме $w = \frac{1}{a-b}(z + ab\bar{z} - a - b)$. За да го докажеме тврдењето на задачата, доволно е да докажеме дека $\bar{w} = -w$. Користејќи го условот на задачата имаме $a\bar{a} = b\bar{b} = 1$, од каде добиваме

$$\begin{aligned}\bar{w} &= \frac{1}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}\left(\bar{z} + \frac{1}{ab}z - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \\ &= \frac{ab}{b-a} \cdot \frac{1}{ab}(ab\bar{z} + z - b - a) \\ &= -\frac{1}{b-a}(z + ab\bar{z} - a - b) = -w.\end{aligned}$$

2Б. Нека x е реален број за кој важи $x + \frac{1}{x} = 3$ и нека $S_m = x^m + \frac{1}{x^m}$. Одреди ја вредноста на S_7 .

Решение. Прво со помош на дадената врска $x + \frac{1}{x} = 3$ ја наоѓаме вредноста на изразот

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 3^2 - 2 = 7.$$

Сега со помош на овој чекор ја наоѓаме вредноста на


$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right) \cdot \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) = 3 \cdot 7 - 3 = 18.$$

Понатаму, $x^4 + \frac{1}{x^4} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 = 7^2 - 2 = 47$. Конечно

$$S_7 = x^7 + \frac{1}{x^7} = \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) \cdot \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) = 18 \cdot 47 - 3 = 843.$$

3АБ. Нека D е точка во внатрешноста на триаголникот ABC и нека AD ја сече BC во A' , а BD ја сече AC во B' . Ако плоштината на триаголниците ABD , $AB'D$ и $BA'D$ се 14, 4 и 7, соодветно, определи ја плоштината на четириаголникот $CB'DA'$.

Решение. Нека AA'' , BB'' и CC'' се висините на триаголникот ABC каде што A'' , B'' и C'' се подножјата на висините. Нека DD_a , DD_b и DD_c се нормали кон страните BC , CA и AB , каде што D_a , D_b и D_c



лежат на соодветната страна. Нека P е плоштината на триаголникот ABC .
Тогаш имаме:

$$\frac{P}{P_{ABD}} = \frac{P}{14} = \frac{\overline{CC''}}{\overline{DD_c}}, \quad \frac{P_{ABA'}}{P_{DBA'}} = \frac{14+7}{7} = \frac{\overline{AA''}}{\overline{DD_a}}, \quad \frac{P_{BB'A}}{P_{DB'A}} = \frac{14+4}{4} = \frac{\overline{BB''}}{\overline{DD_b}}$$

и оттука

$$\overline{DD_c} = 14 \frac{\overline{CC''}}{P}, \quad \overline{DD_a} = \frac{\overline{AA''}}{3} \quad \text{и} \quad \overline{DD_b} = \frac{2\overline{BB''}}{9}.$$

За плоштината на триаголникот ABC имаме

$$\begin{aligned} P &= \frac{\overline{AB} \cdot \overline{DD_c}}{2} + \frac{\overline{BC} \cdot \overline{DD_a}}{2} + \frac{\overline{CA} \cdot \overline{DD_b}}{2} \\ &= \frac{\overline{AB}}{2} \cdot 14 \frac{\overline{CC''}}{P} + \frac{\overline{BC}}{2} \cdot \frac{\overline{AA''}}{3} + \frac{\overline{CA}}{2} \cdot \frac{2\overline{BB''}}{9} \\ &= 14 + \frac{P}{3} + \frac{2P}{9}, \end{aligned}$$

и оттука $P = \frac{63}{2}$. Тогаш за плоштината на четириаголникот CB_1DA_1 имаме
 $\frac{63}{2} - 4 - 14 - 7 = \frac{13}{2}$.

4А. За кои вредности на параметарот $a \geq 0$ равенката

$$2|x-a| + 3|x+a| = 1$$

има барем едно реално решение?

Решение. Ќе разгледаме неколку случаи.

Ако $x < -a$, тогаш дадената равенка го добива следниот облик:
 $-2(x-a) - 3(x+a) = 1$. Оттука добиваме $x = -\frac{a+1}{5}$. Дадената равенка има барем едно решение, па затоа треба да важи $-\frac{a+1}{5} < -a$, односно $a < \frac{1}{4}$. Ако $-a \leq x \leq a$, тогаш добиваме $-2(x-a) + 3(x+a) = 1$. Оттука добиваме $x = 1 - 5a$ и во овој случај треба да важи $-a \leq 1 - 5a \leq a$, односно $\frac{1}{6} \leq a \leq \frac{1}{4}$. Ако $x > a$, тогаш имаме $2(x-a) + 3(x+a) = 1$. Оттука добиваме $x = \frac{1-a}{5}$. За x да биде решение на дадената равенка, треба да важи $\frac{1-a}{5} > a$, односно $a < \frac{1}{6}$. Заклучуваме дека дадената равенка има реално решение за $0 \leq a \leq \frac{1}{4}$.

4Б. Реши го системот равенки:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ |x - y| + y = 1 \end{cases}.$$

Решение. Ќе разгледаме два случаи: $x \geq y$ и $x < y$. За $x \geq y$ важи $|x - y| = x - y$. Втората равенка од системот станува $x - y + y = 1 \Leftrightarrow x = 1$. Заменуваме во првата равенка и добиваме $3 + 2y = 1 \Leftrightarrow y = -1$. Навистина, $x = 1 > -1 = y$, па ова е едно решение. За $x < y$ важи $|x - y| = y - x$. Втората равенка од системот станува $-x + 2y = 1$. Ја одземеме втората равенка од првата и добиваме $4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Заменуваме во првата равенка и добиваме $2y = 1 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}$. Навистина, $x = 0 < \frac{1}{2} = y$, па со тоа добивме уште едно решение. Заклучуваме дека решенија на дадениот систем равенки се $(x, y) = (1, -1)$ и $(x, y) = (0, \frac{1}{2})$.

III година

1АБ. Реши ја равенката $2^{2x} \cdot 9^x - 2 \cdot 6^{3x-1} + 4^{2x-1} \cdot 3^{4x-2} = 0$.

Решение. Ја трансформираме равенката во облик

$$4^x \cdot 9^x - \frac{6^{3x}}{3} + \frac{4^{2x} \cdot 9^{2x}}{36} = 0, \text{ т.е. } 36^x - \frac{36^x \cdot 6^x}{3} + \frac{36^{2x}}{36} = 0.$$

Множиме со 36 и ја добиваме еквивалентната равенка

$$36 \cdot 36^x - 12 \cdot 36^x \cdot 6^x + 36^{2x} = 0.$$

Ако равенката ја поделиме со $36^x \neq 0$ ја добиваме равенката

$$36^x - 12 \cdot 6^x + 36 = 0$$

која со воведување на смената $6^x = y$ се сведува на квадратна равенка од облик $y^2 - 12 \cdot y + 36 = 0$. Решенијата на равенката се $y_1 = y_2 = 6$, а со замена $6^x = 6$ добиваме дека $x = 1$.

2АБ. Докажи дека ако $\sin x + \cos x = \sqrt{3}$, тогаш $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 1$.

Решение. Од $\sin x + \cos x = \sqrt{3}$, со квадрирање добиваме

$$\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 3, \text{ т.е. } \sin x \cos x = 1.$$

Сега, $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = 1$.

3А. Нека функцијата $f(x) = x^2 - 2x - 1$ е зададена на множеството $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^4 + 36 \leq 13x^2\}$.

Одреди ги најмалата и најголемата вредност на функцијата f .

Решение. Решение на неравенката $x^4 - 13x^2 + 36 \leq 0$ е унијата на интервали $[-3, -2] \cup [2, 3]$. Навистина, со смена $y = x^2$, неравенката добива облик $y^2 - 13y + 36 \leq 0$. Квадратната равенка $y^2 - 13y + 36 = 0$, има решенија $y_1 = 4, y_2 = 9$, а затоа што квадратната парабола е отворена нагоре, функцијата прима негативни вредности или е еднаква на нула за $x^2 = y \in [4, 9]$. Значи,

$$4 \leq x^2 \leq 9 \Leftrightarrow 2 \leq |x| \leq 3 \Leftrightarrow x \in [-3, -2] \cup [2, 3].$$

Функцијата $f(x) = x^2 - 2x - 1$ има теме во точката $x = 1$, во која го постигнува и својот минимум. Затоа јасно е дека $f(x)$, во однос на добиените интервали на кои е дефинирана, опаѓа на интервалот $[-3, -2]$, а расте на $[2, 3]$. Сега, може да запишеме:

1) За $x \in [-3, -2]$, $14 = f(-3) \geq f(x) \geq f(-2) = 7$.

2) За $x \in [2, 3]$, $-1 = f(2) \leq f(x) \leq f(3) = 2$.

Конечно, најмалата вредност на функцијата f е $m = -1$, за $x = 2$, а најголемата е $M = 14$, а се постигнува во $x = -3$.

3Б. Нека за a и b реални броеви, каде $a \neq 0$, равенките $ax^2 + bx + b = 0$ и $ax^2 + ax + b = 0$ имаат реални корени. Производот на еден корен на првата равенка со еден корен на втората равенка е 1. Одреди го збирот $a + b$.

Решение. Да ги означиме со y - коренот на $ax^2 + bx + b = 0$ и z - коренот на $ax^2 + ax + b = 0$, за кои $yz = 1$. Јасно, $y, z \neq 0$, па од $z = \frac{1}{y}$, со замена во соодветните равенки добиваме

$$ay^2 + by + b = 0 \text{ и } a\frac{1}{y^2} + a\frac{1}{y} + b = 0 \Leftrightarrow by^2 + ay + a = 0.$$

Ги собираме двете равенства, од каде имаме ново равенство

$$(a+b)y^2 + (a+b)y + (a+b) = 0 \Leftrightarrow (a+b)(y^2 + y + 1) = 0.$$

Но $y^2 + y + 1 \neq 0$, па заклучуваме дека $a + b = 0$.

4А. Даден е конус чија обвивка има плоштина M и чија основа има плоштина B . Ако волуменот на конусот е два пати поголем од волуменот на топката впишана во конусот, одреди ја вредноста на количникот $\frac{M}{B}$.

Решение. Нека H е висината на конусот, r - радиусот на основата на конусот, R - радиусот на впишаната топка и s - генератрисата на конусот. Од сличноста на правоаголните триаголници на цртежот важи $\frac{r}{s} = \frac{R}{H-R}$. Исто така, $H = \sqrt{s^2 - r^2}$. Го средуваме првиот израз, па добиваме

$$Rs = r(H - R) \Leftrightarrow R(s + r) = rH,$$

од каде $R = \frac{rH}{s+r}$. Понатаму заменуваме за


висината H и имаме $R = \frac{r\sqrt{s^2 - r^2}}{s+r} = r\sqrt{\frac{s-r}{s+r}}$. Ќе ги означиме волумените на двете тела со V_1 - волуменот на конусот и V_2 - волуменот на топката. Односот на волумените е 2, па важи

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{r^2\pi H}{3}}{\frac{4R^3\pi}{3}} = \frac{r^2H}{4R^3} = \frac{r^2\sqrt{(s-r)(s+r)}}{4r^3\sqrt{\frac{(s-r)^3}{(s+r)^3}}} = \frac{1}{4r} \frac{(s+r)^2}{s-r} = 2.$$

Од последната релација се добива


$$8r(s-r) = (s+r)^2 \Leftrightarrow 8rs - 8r^2 = s^2 + 2sr + r^2 \Leftrightarrow (3r-s)^2 = 0,$$

а од тука јасно, $s = 3r$. Сега, $\frac{M}{B} = \frac{r\pi s}{r^2\pi} = \frac{s}{r} = 3$.



4Б. Дадена е коцка во која е впишана сфера, а во сферата повторно е впишана коцка. Во оваа (втората) коцка е впишана сфера и на крај, во втората сфера е повторно впишана коцка (три коцки и две сфери). Одреди го односот на волумените на најголемата (надворешната) коцка и најмалата (внатрешната) коцка.

Решение. Ќе го означиме работ на внатрешната коцка (најмалата) со a . Дијаметарот на сферата која е опишана околу неа изнесува колку простор-ната дијагонала на коцката, што изнесува точно $d = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$. Работ на следната опишана коцка одговара на должината на дијаметарот на претходната сфера, па е точно



$a\sqrt{3}$. Сега е веќе јасно дека односот на работ на коцката и опишаната сфера, изнесува точно $\sqrt{3}$, па втората сфера има дијаметар $a\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3a$, а најголемата коцка има раб $3a$. Односот на волумените на најголемата и најмалата коцка е тогаш $\frac{(3a)^3}{a^3} = 27$.

IV година

1A. Одреди ги сите позитивни реални броеви a, b, c за кои што важи

$$2\sqrt{a} + 3\sqrt{b} + 6\sqrt{c} = a + b + c = 49.$$

Решение. Од $a + b + c - 2(2\sqrt{a} + 3\sqrt{b} + 6\sqrt{c}) = 49 - 2 \cdot 49 = -49$ имаме

$$a + b + c - 2(2\sqrt{a} + 3\sqrt{b} + 6\sqrt{c}) + 49 = 0,$$

Односно

$$a - 4\sqrt{a} + 4 + b - 6\sqrt{b} + 9 + c - 12\sqrt{c} + 36 = 0$$

$$(\sqrt{a} - 2)^2 + (\sqrt{b} - 3)^2 + (\sqrt{c} - 6)^2 = 0$$

Збир на квадрати е еднаков на 0 ако секој собирок е еднаков на 0, па добиваме $a = 4, b = 9, c = 36$.

2A. Низата a_n е зададена со $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - a_n^2}}{2}}$. Одреди ја формулата за општиот член на низата a_n , како функција од n .

Решение. Јасно е дека $0 \leq a_n \leq 1$. Значи може да ја искористиме смената $a_n = \sin \alpha$, каде за аголот важи $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Тогаш

$$a_{n+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sin \frac{\alpha}{2}.$$

Според тоа $a_1 = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2}, a_2 = \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^2}, \dots, a_n = \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$.

3A. На еден натпревар учествувале 100 ученици и биле дадени пет задачи. Познато е дека секоја задача ја решиле барем 60 ученици. Докажи дека постојат двајца ученици кои **заедно** ги решиле сите задачи.

Решение. Првата задача не ја решиле најмногу 40 ученици (бидејќи ја решиле најмалку 60), па бројот на парови ученици, такви што ниту еден ученик во парот не ја решил првата задача е најмногу $\binom{40}{2}$. Бидејќи ана-

логно размислување важи и за преостанатите задачи, следува дека бројот на парови ученици, такви што ниту еден ученик во тој пар не решил одредена задача, не е поголем од $5 \cdot \binom{40}{2} = 3900$. Но, бидејќи вкупниот број парови ученици е $\binom{100}{2} = 4950 > 3900$, следува дека постои пар ученици кои заедно ги решиле сите пет задачи.

4А. Нека $a < b < c$, $a + c = 2b$ и $\frac{r}{R} = \frac{2-\sqrt{3}}{2}$, каде $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$ и $c = \overline{AB}$ се должините на страните, а r и R се радиусите на впишаната и опишаната кружница на $\triangle ABC$. Одреди ја големината на аголот во темето B .

Решение. Од синусната теорема имаме $\frac{b}{\sin \beta} = 2R$ т.е. $b = 2R \sin \beta$. Плоштината на $\triangle ABC$ е $P = sr = \frac{a+b+c}{2} \cdot r = \frac{abc}{4R}$, од каде со замена на $a + c = 2b$ се добива: $\frac{3b}{2} \cdot r = \frac{abc}{4R} \Leftrightarrow 6rR = ac$. Од косинусната теорема имаме

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta = (a + c)^2 - 2ac - 2ac \cos \beta \\ = (a + c)^2 - 2ac(1 + \cos \beta) = (2b)^2 - 2 \cdot 6rR(1 + \cos \beta)$$

$$12rR(1 + \cos \beta) = 3b^2$$

$$4rR(1 + \cos \beta) = 4R^2 \sin^2 \beta$$

$$r(1 + \cos \beta) = R(1 + \cos \beta)(1 - \cos \beta)$$

Ако последното равенство го скратиме со $1 + \cos \beta$, бидејќи $\beta \neq 180^\circ$ ќе добиеме дека $r = R(1 - \cos \beta)$. Од условот на задачата имаме дека $\frac{r}{R} = \frac{2-\sqrt{3}}{2} = 1 - \cos \beta$ од каде следува дека $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ т.е. $\beta = 30^\circ$.

1Б. Нека a, b, c, d се четири последователни членови на геометричка прогресија. Докажи дека $(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) = (ab + bc + cd)^2$.

Решение. Од тоа што a, b, c, d се четири последователни членови на геометричка прогресија, може да ставиме дека $b = aq$, $c = aq^2$, $d = aq^3$, па

$$(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) = (a^2 + a^2q^2 + a^2q^4)(a^2q^2 + a^2q^4 + a^2q^6) \\ = a^4q^2(1 + q^2 + q^4)^2.$$

Слично,

$$(ab+bc+cd)^2 = (a^2q+a^2q^3+a^2q^5)^2 = a^4q^2(1+q^2+q^4)^2,$$

со што е докажано бараното равенство.

2Б. На колку различни начини можат да се постават 3 шаховски фигури топ на шаховска табла (8x8), така што топовите меѓусебно не се напаѓаат?

Забелешка. Топот напаѓа исклучиво по хоризонтала и по вертикала.

Решение. Првиот топ може да се постави било каде на таблата, односно постојат $8 \cdot 8 = 64$ можни позиции. Бидејќи првиот топ не треба да го напаѓа вториот топ, за вториот топ остануваат $7 \cdot 7 = 49$ слободни полиња каде може да се постави (без една редица и една колона на кои напаѓа првиот топ). На сличен начин, за третиот топ остануваат $6 \cdot 6 = 36$ слободни полиња. Бидејќи редоследот на поставување на топовите не е битен (сите се еднакви меѓу себе), вкупно можни начини на поставување на топовите, без било кои два меѓусебно да се напаѓаат меѓу себе, има $\frac{64 \cdot 49 \cdot 36}{3!} = 18816$.

3Б. Одреди ги сите парови на ненегативни цели броеви (a, b) кои ја задоволуваат равенката $2^a 3^b - 3^{b+1} + 2^a = 13$.

Решение. Равенката може да ја запишеме во облик $3^b(2^a - 3) = 13 - 2^a$. Бидејќи $3^b > 0$, броевите $2^a - 3$ и $13 - 2^a$ треба да имаат ист знак. Притоа, единствено можно е $2^a - 3 > 0$ и $13 - 2^a > 0$ па оттука добиваме дека $3 < 2^a < 13$. Ненегативни цели броеви за кои важи ова двојно неравенство се $a = 2$ и $a = 3$. За $a = 2$ имаме $b = 2$. За $a = 3$ имаме $b = 0$.

Значи, единствени решенија се паровите $(2, 2)$ и $(3, 0)$.

4Б. Докажи дека за сите реални броеви x и y важи неравенството

$$(x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y) + y^4 \geq 0.$$

Кога важи знакот за равенство?

Решение. Имаме

$$\begin{aligned} A &= (x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y) + y^4 \\ &= [(x+y)(x+4y)] \cdot [(x+2y)(x+3y)] + y^4 \\ &= (x^2 + 5xy + 4y^2)(x^2 + 5xy + 6y^2) + y^4 \\ &= (x^2 + 5xy + 4y^2)^2 + 2y^2(x^2 + 5xy + 4y^2) + y^4, \\ &= (x^2 + 5xy + 4y^2 + y^2)^2 = (x^2 + 5xy + 5y^2)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Знакот за равенство важи ако и само ако $x^2 + 5xy + 5y^2 = 0$. Со решавање на оваа равенка (квадратна) по x , добиваме $x_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{5}}{2} y$.