

Општински натпревар 2023

I година

1A. Еден селанец пошол на пазар и со себе понел n вреќи со компири. На патот од селото до пазарот требало да плати давачки на три капи. На првата капија давачката му била $\frac{1}{4}$ од товарот со кој пристигнал, но стражарот се сожалил на селанецот, па од наплатеното му вратил три вреќи. На втората капија давачката на селанецот била $\frac{1}{3}$ од товарот со кој пристигнал, но и вториот стражар се сожалил на селанецот, па од наплатеното му вратил две вреќи. На последната, трета капија давачката на селанецот била $\frac{1}{2}$ од товарот со кој пристигнал, но и овој стражар се сожалил и од наплатеното на селанецот му вратил една вреќа. Кога стигнал на пазарот селанецот избројал дека му останале точно половина од бројот на вреќи со компири со кои тргнал на пазар. Со колку вреќи компири селанецот тргнал на пазар?

Решение. *Прв начин.* На првата капија селанецот пристигнал со n вреќи. Според условот на задачата давачката му била $\frac{1}{4}$ од товарот со кој пристигнал, што значи дека му останале $\frac{3}{4}$ од товарот, т.е. $\frac{3n}{4}$ вреќи со компири. Бидејќи стражарот му вратил три вреќи, селанецот од првата капија заминал со $\frac{3n}{4} + 3$ вреќи. На втората капија давачката му била $\frac{1}{3}$ од товарот со кој пристигнал, значи му останале $\frac{2}{3}$ од товарот со кој пристигнал, т.е. $\frac{2}{3} \left(\frac{3n}{4} + 3 \right) = \frac{2n}{4} + 2 = \frac{n}{2} + 2$. Вториот стражар му вратил две вреќи, па селанецот од втората капија заминал со $\frac{n}{2} + 2 + 2 = \frac{n}{2} + 4$ вреќи. На третата капија давачката му била $\frac{1}{2}$ од товарот со кој пристигнал, па му останала $\frac{1}{2}$ од товарот со кој пристигнал, т.е. $\frac{1}{2} \left(\frac{n}{2} + 4 \right) = \frac{n}{4} + 2$. Но третиот стражар му вратил една вреќа, па селанецот од третата капија заминал со $\frac{n}{4} + 2 + 1 = \frac{n}{4} + 3$ вреќи.

На пазарот пристигнал со половина од бројот на вреќи со кој пошол, значи $\frac{n}{2} = \frac{n}{4} + 3$, од каде следи дека $n = 12$ вреќи компири.

Втор начин. Од текстот на задачата имаме дека $\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \left(n - \frac{n}{4} + 3 \right) + 2 \right) + 1 = \frac{n}{2}$, од каде $\frac{n}{4} + 3 = \frac{n}{2}$, односно селанецот тргнал со $n = 12$ вреќи компири.

1Б. Во зоолошка градина имало 5 врапчиња со еднакви маси и 6 ластовички со еднакви маси. При мерење на вкупната маса на сите врапчиња и вкупната маса на сите ластовички со помош на вага, се покажало дека масата на сите врапчиња е поголема од масата на сите ластовички. Ако едно врапче си го замени местото со една ластовичка, тогаш вагата ќе биде во рамнотежа. Вкупната маса на врапчињата и ластовичките е 380 грама. Колку изнесува масата на едно врапче, а колку масата на една ластовичка?

Решение. Да ја означиме масата на едно врапче со x , а масата на една ластовичка со y . Тогаш, имаме дека $5x > 6y$, но ако едно врапче си го промени местото со една ластовичка, тогаш вагата ќе биде во рамнотежа, односно $4x + y = 5y + x$. Вкупната маса на врапчињата и ластовичките е 380 грама, односно $5x + 6y = 380$. Од првата равенка имаме $3x = 4y$ т.е. $y = \frac{3x}{4}$ и со замена во втората добиваме $5x + 6 \cdot \frac{3x}{4} = 380$, од каде $x = 40$, па затоа $y = 30$. Масата на едно врапче изнесува 40 грама, а на една ластовичка 30 грама.

2А. Дадени се множествата

$$A = \{11k + 8 \mid k \in \mathbb{Z}\}, B = \{4m \mid m \in \mathbb{Z}\} \text{ и } C = \{11 \cdot (4n + 1) - 3 \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Докажи дека $A \cap B = C$.

Решение. Ќе ја докажеме еквиваленцијата $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in C$. Со тоа ќе биде докажана дадената еднаквост.

\Rightarrow : Нека $x \in A \cap B$. Тогаш $x \in A$ и $x \in B$. Значи, постојат цели броеви k и m , така што $x = 11k + 8$ и $x = 4m$, односно $11k + 8 = 4m$. Оттука добиваме дека $11k = 4m - 8$, односно $11k = 4 \cdot (m - 2)$. Бидејќи 11 и 4 се заемно прости броеви, следува дека $4 \mid k$, т.е. $k = 4t$, за некој $t \in \mathbb{Z}$. Тогаш бројот x може да се запише како

$$x = 11k + 8 = 11 \cdot 4t + 8 = 11 \cdot 4t + 11 - 3 = 11 \cdot (4t + 1) - 3.$$


Јасно, $x \in C$. Докажавме дека $x \in A \cap B \Rightarrow x \in C$.

\Leftarrow : Нека $x \in C$. Тогаш постои $n \in \mathbb{Z}$, така што $x = 11 \cdot (4n + 1) - 3$. Средуваме до облик $x = 11 \cdot 4n + 8 = 4 \cdot (11n - 2)$. Ако замениме со $u = 4n$, $u \in \mathbb{Z}$ и $v = 11n - 2$, $v \in \mathbb{Z}$, добиваме дека $x = 11 \cdot u + 8 = 4 \cdot v$. Следува $x \in A \cap B$. Докажавме дека $x \in C \Rightarrow x \in A \cap B$.

Конечно од претходните разгледувања следува дека $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in C$, а оттука $A \cap B = C$.

2Б. Дали е можно броевите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 да се запишат на кружница така што збирот на било кои два соседни броја не е делив ниту со 3, ниту со 5, ниту со 7?

Решение. Одговорот е потврден, како што може да се види од цртежот десно. Уште повеќе, $n = 9$ е најмалиот природен број различен од 1, таков што броевите од 1 до n можат да се распоредат на кружница така што збирот на кои би-ло два соседни броја не е делив ниту со ниту со 3, ниту со 5, ниту со 7. Имено, ако $1 < n < 9$ тогаш 2 и 4 може да го имаат за сосед само бројот 6 и 7 соодветно. За лесно да го конструираме добиеното решение, доволно е да забележиме дека на кружницата:



- i) 1 мора да е меѓу 3 и 7,
- ii) 2 мора да е меѓу 6 и 9,
- iii) 4 мора да е меѓу 7 и 9.

Распоредување на останатите броеви е како на цртежот.

3АБ. Нека a и b се цели броеви такви што во развиениот облик на полиномот $(x^2 + ax + b)^3$ коефициентот пред x^4 е 99, а коефициентот пред x е 162. Најди ги вредностите на броевите a и b .

Решение. *Прв начин.* Дадениот израз го запишуваме во развиен облик:

$$\begin{aligned} A &= (x^2 + ax + b)^3 = (x^2)^3 + 3(x^2)^2(ax + b) + 3x^2(ax + b)^2 + (ax + b)^3 \\ &= x^6 + 3x^4(ax + b) + 3x^2(a^2x^2 + 2axb + b^2) + a^3x^3 + 3a^2x^2b + 3abx^2 + b^3 \\ &= x^6 + 3ax^5 + 3bx^4 + 3a^2x^4 + 6abx^3 + 3b^2x^2 + a^3x^3 + 3a^2bx^2 + 3ab^2x + b^3 \\ &= x^6 + 3ax^5 + (3b + 3a^2)x^4 + (6ab + a^3)x^3 + (3b^2 + 3a^2b)x^2 + 3ab^2x + b^3. \end{aligned}$$

Коефициентот пред x^4 е $3b + 3a^2$, а коефициентот пред x е $3ab^2$. Од условите на задачата имаме дека $3b + 3a^2 = 99$ и $3ab^2 = 162$, односно $b + a^2 = 33$ и $ab^2 = 54$. Десните страни на двете равенства се деливи со 3, па затоа мора a и b да бидат деливи со 3 (Зошто?). Сега, за $a = 3m$ и $b = 3n$, каде што m и n се цели броеви, со замена во равенствата добиваме $3n + 9m^2 = 33$ и $27mn^2 = 54$, односно $n + 3m^2 = 11$ и $mn^2 = 2$. Имајќи предвид дека $n^2 > 0$, од $mn^2 = 2$ следува дека $m = 1$ и $n^2 = 2$, што не е можно (n е цел број), или


$m = 2$ и $n^2 = 1$. Оттука $n = -1$ или $n = 1$. Но, равенството $n + 3m^2 = 11$ го задоволува само бројот $n = -1$. Следува дека бараните броеви се $a = 3 \cdot 2 = 6$ и $b = 3 \cdot (-1) = -3$.

Втор начин. Дадениот израз го запишуваме во развиен облик:


$$\begin{aligned} A &= (x^2 + ax + b)^3 = (x^2)^3 + 3(x^2)^2(ax + b) + 3x^2(ax + b)^2 + (ax + b)^3 \\ &= x^6 + 3x^4(ax + b) + 3x^2(a^2x^2 + 2axb + b^2) + a^3x^3 + 3a^2x^2b + 3axb^2 + b^3 \\ &= x^6 + 3ax^5 + 3bx^4 + 3a^2x^4 + 6abx^3 + 3b^2x^2 + a^3x^3 + 3a^2bx^2 + 3ab^2x + b^3 \\ &= x^6 + 3ax^5 + (3b + 3a^2)x^4 + (6ab + a^3)x^3 + (3b^2 + 3a^2b)x^2 + 3ab^2x + b^3. \end{aligned}$$

Коефициентот пред x^4 е $3b + 3a^2$, а коефициентот пред x е $3ab^2$. Од условите на задачата имаме дека $3b + 3a^2 = 99$ и $3ab^2 = 162$, односно $b + a^2 = 33$ и $ab^2 = 54$. Бидејќи $54 = 2 \cdot 3^3$, од $ab^2 = 54$ заклучуваме дека $b^2 = 1$ или $b^2 = 9$. Ако $b^2 = 1$, тогаш $a = 54$, и со замена во (1) добиваме дека $b = 33 - 54^2 = -2883$, што не е можно, затоа што $b^2 = 1$. Значи, $b^2 = 9$, па од (2) следи дека $a = 6$. Со замена во $b + a^2 = 33$ добиваме дека $b = 33 - 6^2 = -3$, што е во ред, затоа што $b^2 = 9$. Значи, $a = 6$ и $b = -3$.

4АБ. Правите p и q се паралелни со основите на трапезот $ABCD$ и го делат кракот AD на три еднакви дела. Најди ги должините на отсечките x и y кои краците ги отсекуваат од правите p и q соодветно, ако $\overline{AB} = 13$ и $\overline{CD} = 4$.



Решение. Нека пресечните точки на правите p и q со кракот AD се P и Q соодветно. Тогаш, $\overline{DP} = \overline{PQ} = \overline{QA} = a$. Низ темето D повлекуваме права паралелна со кракот BC која основата AB ја сече во точката E . Нека пресечните точки на на правите p и q со отсечката DE се R и S соодветно. Четириаголникот $EBCD$ е паралелограм (од $EB \parallel CD$ и $BC \parallel ED$), од каде $\overline{EB} = \overline{CD} = 4$ и $\overline{AE} = \overline{AB} - \overline{EB} = 13 - 4 = 9$. Но, исто така и $\overline{RM} = \overline{SN} = 4$, каде M и N се



пресечните точки на правите p и q со кракот BC соодветно. Од сличноста $\triangle AED \sim \triangle QSD$ имаме $\overline{AE} : \overline{QS} = \overline{AD} : \overline{QD}$, односно $9 : \overline{QS} = (3a) : (2a)$, од каде $\overline{QS} = \frac{9 \cdot 2a}{3a} = 6$, па $y = \overline{QS} + \overline{SN} = 6 + 4 = 10$. Од сличноста на $\triangle AED \sim \triangle PRD$ имаме $\overline{AE} : \overline{PR} = \overline{AD} : \overline{PD}$, односно $9 : \overline{PR} = (3a) : a$, од каде $\overline{PR} = \frac{9a}{3a} = 3$, па $x = \overline{PR} + \overline{RM} = 3 + 4 = 7$.

II година

1A.2B. Ако x и y се реални решенија на системот

$$\begin{cases} x + \frac{x}{y} + y = 8 \\ x \cdot \frac{x+y}{y} = 15 \end{cases},$$

најди ја најмалата вредност на збирот $x + y$.

Решение. Ќе ставиме смена $x + y = u$ и $\frac{x}{y} = v$ и добиваме еквивалентен систем на дадениот,

$$\begin{cases} u + v = 8 \\ u \cdot v = 15 \end{cases}.$$

Последниот систем ќе го решиме со помош на метод на замена, ставајќи $v = 8 - u$. Добиваме $u(8 - u) = 15 \Leftrightarrow u^2 - 8u + 15 = 0 \Leftrightarrow u_1 = 3, u_2 = 5$. Јасно е дека најмалата вредност на збирот е $x + y = u = 3$.

1B. Нека a, b, c, d и e се последователни природни броеви такви што $a < b < c < d < e$. Ако $a^2 + b^2 + c^2 = d^2 + e^2$, која е вредноста на a ?

Решение. Бидејќи броевите се последователни ќе ги означиме со $n-1, n, n+1, n+2$ и $n+3$. Добиваме равенство

$$(n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 = (n+2)^2 + (n+3)^2$$

кое е еквивалентно со $3n^2 + 2 = 2n^2 + 10n + 13$, т.е. со $n^2 - 10n - 11 = 0$. Решенија на последната равенка се 11 и -1 , па според условите на задачата следува $n = 11$. Тогаш $a = 11 - 1 = 10$.

2A. Реши ја параметарската квадратна равенка

$$(a^2 - b^2)x^2 + ab = (a^2 + b^2)x$$

со параметри a и b .

Решение. Равенката $(a^2 - b^2)x^2 + ab = (a^2 + b^2)x$ е еквивалентна со $(a^2 - b^2)x^2 - (a^2 + b^2)x + ab = 0$ чии решенија се

$$x_{1,2} = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{(a^2 + b^2)^2 - 4ab(a^2 - b^2)}}{2(a^2 - b^2)}$$

$$x_{1,2} = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - 4a^3b + 4ab^3}}{2(a^2 - b^2)}$$

$$x_{1,2} = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{(a^2 - 2ab - b^2)^2}}{2(a^2 - b^2)}$$

$$x_1 = \frac{a^2 + b^2 + a^2 - 2ab - b^2}{2(a^2 - b^2)} = \frac{2a^2 - 2ab}{2(a^2 - b^2)} = \frac{a(a-b)}{(a-b)(a+b)} = \frac{a}{a+b}, \quad a \neq \pm b$$

$$x_1 = \frac{a^2 + b^2 - a^2 + 2ab + b^2}{2(a^2 - b^2)} = \frac{2b^2 + 2ab}{2(a^2 - b^2)} = \frac{b(b+a)}{(a-b)(a+b)} = \frac{b}{a-b}, \quad a \neq \pm b$$


Ако $a = \pm b$ тогаш равенката нема да е квадратна и ќе има решение $x = \frac{\pm b^2}{2b^2} = \pm \frac{1}{2}$ кога $b \neq 0$.

Ако $a = b = 0$, равенката има бесконечно многу решенија.

3А. Даден е рамностран триаголник ABC и точка D на правата AB таква што $\overline{AB} = 2\overline{BD}$. Притоа, нормалата спуштена од точката D кон AC ја сече страната BC во точка E и страната AC во точка F . Ако $\overline{CF} = 6$, колку е плоштината на четириаголникот $ABEF$?

Решение. Бидејќи триаголникот ECF е правоаголен со остри агли од 30° и 60° , следува дека $\overline{CE} = 2\overline{CF} = 12$ и тогаш $\overline{FE} = \sqrt{12^2 - 6^2} = 6\sqrt{3}$. Нека страната на рамностраниот триаголник е a . Од правоаголниот триаголник ADF со остри агли од 30° и 60° следува дека $2\overline{FA} = \overline{AD}$, т.е.


$2(a-6) = a + \frac{a}{2}$ и отука добиваме $a = 24$. За плоштината на четири-



аголникот $ABEF$ имаме $P_{ABC} - P_{ECF} = \frac{24^2\sqrt{3}}{4} - \frac{6 \cdot 6\sqrt{3}}{2} = 126\sqrt{3}$.

3Б. Бобан направил јорган со димензии 2 m и 3 m . Тој има уште 6 m^2 материјал кој што може да го искористи за да додаде раб околу јорганот. Колку широк треба да го направи работ за да го искористи целиот материјал? (Работ мора да биде со иста ширина на сите четири страни.)

Решение. Ако нацртаме скица на јорганот, во облик на правоаголник, проблемот се сведува на одредување на плоштина на правоаголник. Така, на цртежот десно, внатрешниот правоаголник е јорганот, а на него е доцртан работ кој Бобан сака да го додаде околу јорганот. За да се искористи целиот материјал за работ, потребно е плоштината



на работ со ширина x да изнесува 6 m^2 (толку материјал преостанало). Таа плоштина може да се пресмета како разлика на плоштината на големиот правоаголник со страни $(2+2x)$ и $(3+2x)$ и плоштината на внатрешниот правоаголник со страни 2 и 3 . Добиваме равенка: $(2+2x) \cdot (3+2x) - 2 \cdot 3 = 6 \Leftrightarrow 4x^2 + 10x - 6 = 0$. Решенијата на квадратната равенка се $x_1 = \frac{1}{2}$ и $x_2 = -3$. Второто решение не се зема предвид бидејќи е негативен број, па останува ширината на работ околу јорганот да е $x = 0,5\text{ m}$.

4АБ. Ева и Сара заедно имаат 51 година. Марко и Сара заедно имаат 54 години. Ако збирот на цифрите на годините на Сара е за 1 поголем од годините на Ева, колку години има Марко?

Решение. Нека годините на Ева се x , годините на Сара се y и годините на Марко се z . Тогаш, $x + y = 51$, $z + y = 54$, па јасно, Сара има или едноцифрен или двоцифрен број на години. Нека $y = 10a + b$, каде $a, b = 0, 1, \dots, 9$. Од условот на задачата тогаш $a + b = 1 + x$. Заменувајќи во првата равенка, добиваме $a + b - 1 + 10a + b = 51$, т.е. $11a + 2b = 52$. Од последната равенка следува дека a е парен број, т.е. парна цифра па $a = 0, 2, 4, 6, 8$. Со проверка, добиваме дека $a = 4$, а оттука $b = 4$. Значи, Сара има 44 години, а тогаш Марко има 10 години.


III година

1А. Нека m и n се природни броеви за кои важи равенството $\log_3(\log_{2^m}(\log_{3^n} 3^{100})) = 0$. Докажи дека бројот n е содржател на бројот 5.

Решение. Дадената равенка е еквивалентна со равенката $\log_{2^m}(\log_{3^n} 3^{100}) = 1$, односно $3^n \cdot 2^m = 3^{100}$. Оттука $n \cdot 2^m = 100$, од каде $m = 1$ и $n = 50$ или $m = 2$ и $n = 25$. Во двата случаи n е содржател на бројот 5.

1Б. Пресметај ја вредноста на $\cos \theta$ ако се знае дека $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ и $\operatorname{tg} \theta = -\frac{8}{3}$.

Решение. Косинусот е парна функција, а за агол $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ истиот е негативен. Сега, според условите на задачата, конструираме триаголник како на цртежот. Хипотенузата на триаголникот е $r = \sqrt{8^2 + (-3)^2} = \sqrt{73}$. Тогаш $\cos \theta = \frac{-3}{\sqrt{73}} = \frac{-3\sqrt{73}}{73}$.



2А. Пресметај ја вредноста на изразот

$$(1 + \operatorname{tg} 1^\circ)(1 + \operatorname{tg} 2^\circ) \dots (1 + \operatorname{tg} 44^\circ)(1 + \operatorname{tg} 45^\circ).$$

Решение. Ако $\alpha + \beta = 45^\circ$, тогаш од идентитетот $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$

добиваме $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta = 1$. Следува

$$(1 + \operatorname{tg} k^\circ)(1 + \operatorname{tg}(45^\circ - k^\circ)) = 1 + \operatorname{tg} k^\circ + \operatorname{tg}(45^\circ - k^\circ) + \operatorname{tg} k^\circ \cdot \operatorname{tg}(45^\circ - k^\circ) = 2,$$

за секој $k = 1, 2, \dots, 22$. Бидејќи $1 + \operatorname{tg} 45^\circ = 2$, добиваме дека

$$(1 + \operatorname{tg} 1^\circ)(1 + \operatorname{tg} 2^\circ) \dots (1 + \operatorname{tg} 44^\circ)(1 + \operatorname{tg} 45^\circ) = 2^{23}.$$


2Б. Реши ја равенката $8^{\frac{2}{x}} - 8 \cdot 2^{\frac{3}{x}} + 12 = 0$.

Решение. Дадената равенка ја запишуваме во облик $2^{3 \cdot \frac{2}{x}} - 8 \cdot 2^{\frac{3}{x}} + 12 = 0$. Воведуваме смена $t = 2^{\frac{3}{x}}$, па последната равенка преминува во квадратна

равенка од облик $t^2 - 8t + 12 = 0$. Решенијата на квадратната равенка се $t_1 = 2$ и $t_2 = 6$. Според тоа, за $t_1 = 2$ добиваме дека $x_1 = 3$, а за $t_2 = 6$ добиваме дека $x_2 = 3 \log_6 2$. Значи, решенија на дадената равенка се $x_1 = 3$ и $x_2 = 3 \log_6 2$.

ЗАБ. За тристрана пирамида $ABCS$, плоштината на основата ABC изнесува 14 cm^2 . Бочните рабови на пирамидата се два по два заемно нормални, а нивните должините се три последователни парни броеви. Пресметај ги плоштината и волуменот на пирамидата.

Решение. Должините на бочните рабови ќе ги означиме со $\overline{AS} = x - 2, \overline{BS} = x, \overline{CS} = x + 2$, за x парен број. Секој од бочните сивови на пирамидата е правоаголен триаголник. Да ги означиме уште и должината на основниот раб $\overline{AB} = c, h_1$ висината во $\triangle ABS$ спуштена кон хипотенузата и h висината во $\triangle ABC$ спуштена кон AB . Плоштината на пирамидата може да се запише како $P = P_{\triangle ABC} + P_{\triangle ACS} + P_{\triangle ABS} + P_{\triangle BCS}$, одно-



сно добиваме $P = 14 + \frac{1}{2}[(x-2)(x+2) + x(x-2) + x(x+2)]$. За обвивката на

пирамидата добиваме $M = \frac{1}{2}(3x^2 - 4) = \frac{3}{2}x^2 - 2$. За плоштината на $\triangle ABS$

може да запишеме $x(x-2) = ch_1$, каде $c = \sqrt{x^2 + (x-2)^2} = \sqrt{2x^2 - 4x + 4}$.

Оттука, со замена во претходното равенство добиваме $h_1 = \frac{x(x-2)}{\sqrt{2x^2 - 4x + 4}}$. Од

$\triangle DCS$ имаме $h = \sqrt{(x+2)^2 + h_1^2}$. За плоштината на основата сега може да

запишеме $28 = ch$, па со замена на погоре добиените вредности, последново

добива облик на равенка $28^2 = (x+2)^2(x^2 + (x-2)^2) + x^2(x-2)^2 = 3x^4 + 16$

од каде $x = 4$. Конечно, за плоштината на пирамидата добиваме $P = 36$ квадратни единици, а за волуменот, заради трите прави агли при врвот,

$V = \frac{x(x-2)(x+2)}{6} = 8$ кубни единици.

4АБ. Определи ги сите парови реални броеви (k, m) за кои $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е квадратна функција од облик $f(x) = (k^2 + m^2)x^2 + kmx + m$ и важи $f(m) = k$ и $f(k) = m$.

Решение. Јасно $k^2 + m^2 \neq 0$, односно $k \neq 0$ или $m \neq 0$. Од условите на задачата го добиваме следниот систем равенки

$$\begin{cases} f(m) = k \\ f(k) = m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (k^2 + m^2)m^2 + km^2 + m = k \\ (k^2 + m^2)k^2 + k^2m + m = m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (k^2 + m^2)m^2 + km^2 + m = k \\ k^2(k^2 + m^2 + m) = 0 \end{cases}$$

Од втората равенка на системот $k^2(k^2 + m^2 + m) = 0$ имаме дека $k = 0$ или $k^2 + m^2 + m = 0$. Ке ги разгледаме двата случаи:

1. За $k = 0$ првата равенка на системот $(k^2 + m^2)m^2 + km^2 + m = k$ преминува во облик $m^4 + m = 0$, односно $m(m^3 + 1) = 0$. Според тоа, $m = 0$ или $m = -1$. Бидејќи f е квадратна функција, $k^2 + m^2 \neq 0$, односно $k \neq 0$ или $m \neq 0$. Единствени броеви кои ги задоволуваат условите на задачата во овој случај се $k = 0$ и $m = -1$.

2. За $k^2 + m^2 + m = 0$, односно за $k^2 + m^2 = -m$ првата равенка на системот $(k^2 + m^2)m^2 + km^2 + m = k$ преминува во облик $-m^3 + km^2 = k - m$. Тогаш $m^2(k - m) = k - m$, односно $(k - m)(m^2 - 1) = 0$. Според тоа имаме две можности $k = m$ или $m^2 = 1$.

2.1. Ако $k = m$, тогаш од $k^2 + m^2 = -m$ имаме дека $2m^2 + m = 0$, односно $m = 0$ или $m = -\frac{1}{2}$. Јасно, во овој случај единствени броеви кои ги исполнуваат условите на задачата се $k = m = -\frac{1}{2}$.

2.2. Ако $m^2 = 1$, тогаш $m = 1$ или $m = -1$. За $m = 1$, од $k^2 + m^2 = -m$ добиваме дека $k^2 + 1 = -1$ и оваа равенка нема решение во множеството реални броеви. За $m = -1$, од $k^2 + m^2 = -m$ добиваме дека $k^2 + 1 = 1$, односно $k = 0$. Значи, во овој случај $k = 0$ и $m = -1$ се броевите кои ги задоволуваат условите на задачата.

Јасно, паровите $(0, -1)$ и $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ се единствените за кои функцијата f ги задоволува условите на задачата.

IV година

1A. Одреди ги сите парови од цели броеви (m, n) такви што

$$4 \cdot 3^{2m} + 5 = n^2.$$

Решение. *Прв начин.* Да воочиме дека од $4 \cdot 3^{2m} = n^2 - 5$ следува дека $4 \cdot 3^{2m}$ е цел број, што значи дека $m \geq 0$.

Даденото равенство го запишуваме во следниот облик: $n^2 - 4 \cdot 3^{2m} = 5$, односно $(n - 2 \cdot 3^m)(n + 2 \cdot 3^m) = 5$, каде изразите во заградите се цели броеви. Бидејќи $n - 2 \cdot 3^m < n + 2 \cdot 3^m$, последното равенство е точно само во следните два случаи:

$$\begin{cases} n - 2 \cdot 3^m = 1 \\ n + 2 \cdot 3^m = 5 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} n - 2 \cdot 3^m = -5 \\ n + 2 \cdot 3^m = -1 \end{cases}$$

Лесно се добива дека решение на првиот систем е $n = 3, m = 0$, а на вториот $n = -3, m = 0$. Конечно, решение на задачата се паровите $(0, -3)$ и $(0, 3)$.

Втор начин. Најпрво, да воочиме дека од $4 \cdot 3^{2m} = n^2 - 5$ следува дека $4 \cdot 3^{2m}$ е цел број, што значи дека $m \geq 0$.

За $m = 0$ добиваме $n^2 = 4 \cdot 3^{2 \cdot 0} + 5 = 9$, од каде следи дека $n = -3$ или $n = 3$. Во овој случај добиваме два пара, $(0, -3)$ и $(0, 3)$. За $m \geq 1$, бројот $n^2 = 4 \cdot 3^{2m} + 5$ при делење со 3 дава остаток 2. Но ова не е можно бидејќи при делење со 3, квадратот на произволен цел број n дава остаток 0 (ако n е делив со 3) или 1 (ако n не е делив со 3). Оттука, за $m \geq 1$ задачата нема решение. Решение на задачата се паровите $(0, -3)$ и $(0, 3)$.

1B. Најди ја најголемата вредност на природниот број n за кој што $25! + 26!$ е делив со 3^n .

Решение. Важи $25! + 26! = 25!(1 + 26) = 3^3 \cdot 25!$. Разгледувајќи ја каноничната факторизација на бројот $25!$ лесно се заклучува дека $25! = 3^{10} \cdot k$, каде k е природен број кој не е делив со 3. Оттука следува $25! + 26! = 3^{13} k$, што значи $n = 13$.

2А. Најди ги сите функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ за кои важи $f(1)=1$ и $f(x+y)=3y \cdot f(x)+2x \cdot f(y)$, за било кои реални броеви x и y .

Решение. Ако во даденото равенство ставиме $x=y=0$, добиваме $f(0)=0$. Ако пак замениме $x=1, y=0$, добиваме $f(1)=2 \cdot f(0)=2 \cdot 0=0$. Бидејќи f е функција, не е можно истовремено да важи $f(1)=0$ и $f(1)=1$. Оттука е јасно дека функција со бараните својства не постои.

2Б. Познато е дека за некои вредности на променливите x и y важи $x^4 y^2 + x^2 + 2x^3 y + 6x^2 y + 8 \leq 0$. Докажи дека $x \geq -\frac{1}{6}$.

Решение. Бидејќи важи

$$x^4 y^2 + x^2 + 2x^3 y + 6x^2 y + 8 = x^4 y^2 + (2x^3 + 6x^2)y + x^2 + 8 \leq 0,$$

изразот може да го разгледуваме како квадратен трином по променлива y кој не е позитивен. За $x \neq 0$, имаме дека $x^4 > 0$, па параболата е отворена нагоре и ја сече x -оската. Тогаш $D = (2x^3 + 6x^2)^2 - 4x^4(x^2 + 8) \geq 0$, од каде следува дека $24x^5 + 4x^4 \geq 0$. Значи $4x^4(6x+1) \geq 0$, па јасно е дека мора $x \geq -\frac{1}{6}$.

3А. Ако за аглиите во триаголникот ABC важи $\frac{\sin^2 \gamma + \sin^2 \beta - \sin^2 \alpha}{\sin \beta \sin \gamma} = \sqrt{3}$,

одреди ја вредноста на аголот α .

Решение. Даденото равенство се запишува во обликот

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \beta} + \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} - \frac{\sin^2 \alpha}{\sin \beta \sin \gamma} = \sqrt{3}, \text{ т.е. } \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} + \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} - \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \sqrt{3}.$$

Со користење на синусната теорема последното равенство се трансформира во обликот $\frac{c}{b} + \frac{b}{c} - \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{c} = \sqrt{3}$ кое е еквивалентно со равенството

$$a^2 = b^2 + c^2 - \sqrt{3}bc \quad (1).$$

Од косинусната теорема го имаме равенството

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha \quad (2)$$

Од (1) и (2) следува дека $2\cos \alpha = \sqrt{3}$, односно $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Од последното равенство добиваме дека $\alpha = 30^\circ$.

3Б. Некои членови на аритметичките прогресии $a_n = 4n + 13$ и $b_n = 5n + 11$, за $n \in \mathbb{N}$, се еднакви. Докажи дека збирот на првите p еднакви членови е еднаков на $p(10p + 11)$.

Решение. Од условот $a_n = b_m$ добиваме

$$4n + 13 = 5m + 11, \text{ т.е. } n = \frac{5m-2}{4} = m + \frac{m-2}{4}.$$

Бидејќи n е природен број, следува дека $k = \frac{m-2}{4} \in \mathbb{N}$. Оттука $m = 4k + 2$, па општиот член на заедничкиот дел од низите е

$$x_k = 5m + 11 = 5(4k + 2) + 11 = 20k + 21, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Притоа, $x_{k+1} - x_k = 20$. Значи, (x_k) е аритметичка прогресија со прв член 21 и разлика 20. Првите p членови се добиваат за $k = 0, 1, 2, \dots, p-1$. За бараниот збир добиваме

$$S_p = \frac{p}{2}(42 + (p-1) \cdot 20) = \frac{p}{2}(20p + 22) = p(10p + 11).$$

4АБ. На еден математички натпревар на кој учествувале n ученици, дадени се вкупно 4 тешки и 8 лесни задачи. Секој од учениците точно решил 11 од задачите. Притоа, за секој пар од тешка и лесна задача, одреден е бројот на ученици кои точно ги решиле и двете задачи и утврдено е дека збирот на овие 32 броеви е 256. Колку ученици учествувале на натпреварот?

Решение. Од условот на задачата, секој ученик на натпреварот не решил точно една тешка или една лесна задача.

Нека l е бројот на ученици кои не решиле лесна задача, а t е бројот на ученици кои не решиле тешка задача. Тогаш, на натпреварот имало вкупно $n = l + t$ ученици. Притоа:

- Секој ученик кој не решил лесна задача, решил 4 тешки и 7 лесни задачи, односно решил $4 \cdot 7 = 28$ парови од лесна и тешка задача.
- Секој ученик кој не решил тешка задача, решил 3 тешки и 8 лесни задачи, односно решил $3 \cdot 8 = 24$ парови од лесна и тешка задача.

Според условите на задачата, имаме дека: $28 \cdot l + 24 \cdot t = 256$, односно $7 \cdot l + 6 \cdot t = 64$. Поради тоа што l и t се природни броеви, од последното равенство заклучуваме дека l е парен број. Натаму, од $t = \frac{64-7l}{6}$ може да заклучиме дека $l \leq 9$. Со директна проверка за броевите $l = 2, 4, 6, 8$ заклучуваме дека целобројна вредност за t се добива само за $l = 4$, при што $t = 6$. Оттука добиваме дека на натпреварот имало $n = 4 + 6 = 10$ ученици.